
临床执业医师资格考试

押题密卷

第一单元

【A1型题】答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 三酰甘油合成的基本原料是
 - A. 甘油
 - B. 胆固醇酯
 - C. 胆碱
 - D. 鞘氨醇
 - E. 胆固醇
2. 下列不参与肝生物转化第二相反应的酶是
 - A. 硫酸基转移酶
 - B. 谷胱甘肽 S-转移酶
 - C. 肽基转移酶
 - D. 葡萄糖醛酸基转移酶
 - E. 甲基转移酶
3. 有关 DNA 碱基组成规律的叙述，错误的是
 - A. 适用于不同种属
 - B. 嘌呤与嘧啶分子相等
 - C. 与遗传特性有关
 - D. 主要由腺嘌呤组成
 - E. 不受年龄与营养状态影响
4. 多肽链中肽键的本质是
 - A. 磷酸二酯键
 - B. 二硫键
 - C. 糖苷键
 - D. 酰胺键
 - E. 疏水键
5. 关于 DNA 变性概念的叙述，错误的是
 - A. 变性后 260nm 波长吸收不改变
 - B. 变性时两条链解离
 - C. 变性时二级结构被破坏
 - D. 变性不伴有共价键断裂
 - E. 加热可导致变性
6. 磷酸戊糖途径的主要产物之一是
 - A. NADPH
 - B. FMN
 - C. CoQ
 - D. cAMP
 - E. ATP



7. 有关同工酶概念的叙述，错误的是

- A. 同工酶常由几个亚基组成
- B. 不同器官的同工酶谱不同
- C. 同工酶的理化性质不同
- D. 同工酶催化不同的底物反应
- E. 同工酶的免疫学性质不同

8. α -酮酸可转变生成的物质是

- A. CO_2 和 H_2O
- B. 营养必需脂肪酸
- C. 维生素 A
- D. 营养必需氨基酸
- E. 维生素 E

9. 琥珀酸氧化呼吸链不含有的组分是

- A. FMN
- B. CoQ
- C. Cyt c
- D. Cyt b
- E. Cytaa₃

10. 主要调节甲状腺激素分泌的因素是

- A. 血镁
- B. 血钙
- C. 血磷
- D. 血 1,25-(OH)₂-维生素 D₃
- E. 降钙素

11. 下列属于正氮平衡的情况是

- A. 创伤
- B. 饥饿
- C. 妊娠
- D. 出血
- E. 贫血

12. 帕金森患者可出现的症状是

- A. 静止性震颤
- B. 意向性震颤
- C. 运动共济失调
- D. 骨骼肌张力降低
- E. 皮肤感觉迟钝

13. 在继发性主动转运过程中，驱动小管液葡萄糖进入肾小管上皮细胞的直接动力是

- A. 膜内外两侧的电位差
- B. 钠泵活动造成的膜两侧 Na^+ 浓度差
- C. 钠泵水解 ATP 释放的能量
- D. 由同向转入细胞的物质提供能量
- E. 由同向转运体水解 ATP 释放的能量

14. 肺换气的驱动力是

- A. 呼吸膜两侧气体分压梯度

-
- B. 呼吸膜气体交换面积
C. 呼吸膜通透性
D. 气体分子与血红蛋白亲和力
E. 气体分子溶解度
15. 在突触传递过程中，触发神经末梢释放的关键因素是
A. 末梢内囊泡数量增加
B. Ca^{2+} 进入末梢内
C. 末梢膜发生超极化
D. 末梢膜上 K^+ 通道激活
E. 末梢内线粒体数量增加
16. 血浆蛋白浓度降低所致水肿的原因是
A. 血浆胶体渗透压降低
B. 动脉血压升向
C. 毛细血管壁通透性增加
D. 淋巴回流量减少
E. 组织液静水压升高
17. 与 CO_2 呼出量关系最密切的肺功能指标是
A. 肺通气量
B. 肺活量
C. 肺泡通气量
D. 最大通气量
E. 用力呼气量
18. 用酒精给高热病人擦浴的散热方式是
A. 蒸发散热
B. 辐射散热
C. 不感蒸发散热
D. 传导散热
E. 对流散热
19. 因毛细血管通透性增加而致胸腔积液的疾病是
A. 肾病综合征
B. 肝硬化
C. 类风湿关节炎
D. 左心衰竭
E. 缩窄性心包炎
20. 肠道病毒一般不引起的疾病是
A. 尿道炎
B. 手足口病
C. 脊髓灰质炎
D. 无菌性脑膜炎
E. 心肌炎
21. 结核分枝杆菌对下列哪项理化因素敏感
A. 碱
B. 酸
C. 紫外线

-
- D. 干燥
E. 寒冷
22. 可以引起菌血症的细菌是
- A. 肉毒梭菌
B. 霍乱弧菌
C. 白喉棒状杆菌
D. 破伤风梭菌
E. 伤寒沙门菌
23. II型超敏反应导致的疾病是
- A. 青霉素过敏休克
B. 新生儿溶血病
C. 接触性皮炎
D. 食物过敏性腹泻
E. 花粉过敏性哮喘
24. 主要由自身反应性T细胞介导的自身免疫性疾病是
- A. 链球菌感染后肾小球肾炎
B. 系统性红斑狼疮
C. 肝出血-肾炎综合征
D. 血小板减少性紫癜
E. 多发性硬化
25. 不参与ADCC作用的免疫分子是
- A. 补体
B. Fc受体
C. 免疫球蛋白
D. 颗粒酶
E. 穿孔素
26. 诊断羊水栓塞的主要病理依据是.
- A. 肺泡腔内透明膜形成
B. 肺泡腔内有胎粪小体
C. 肺泡腔内广泛出血
D. 肺血管内有角化上皮
E. 微循环内透明血栓
27. 免疫标记降钙素阳性的甲状腺肿瘤是
- A. 梭形细胞癌
B. 滤泡腺癌
C. 髓样癌
D. 巨细胞癌
E. 乳头状癌
28. 符合良性高血压血管病变的是
- A. 小动脉外膜纤维增生
B. 小动脉玻璃样变性
C. 细动脉胶原纤维增生.
D. 小动脉平滑肌增生
E. 细动脉玻璃样变性

29. 关于慢性肾盂肾炎大体描述正确的是

- A. 肾弥漫性颗粒状
- B. 肾肿大、苍白
- C. 肾表面散在出血点
- D. 肾不对称性缩小
- E. 肾弥漫性肿大

30. 不会出现肉芽肿性病变的疾病是

- A. 结节病
- B. 细菌性痢疾
- C. 结核病
- D. 血吸虫病
- E. 伤寒

31. 符合早期胃癌诊断条件的是

- A. 肿瘤仅限于胃窦
- B. 癌未累及肌层
- C. 肿瘤直径小于 0.5cm
- D. 黏膜皱襞消失
- E. 肿瘤直径小于 1cm

32. 地塞米松的临床应用不包括

- A. 风湿性心肌炎
- B. 感染中毒性休克
- C. 过敏性紫癜
- D. 骨质疏松
- E. 系统性红斑狼疮

33. 吗啡和哌替啶的共同作用不包括

- A. 体位性低血压
- B. 止泻
- C. 抑制呼吸
- D. 镇痛
- E. 成瘾性

34. 某心理治疗师婉拒了一位正在接受治疗患者请其吃饭的邀请。这一行为所遵循的心理治疗原则是

- A. 保密原则
- B. 关系限定原则
- C. 真诚原则
- D. 客观中立原则
- E. 回避原则

35. 属于影响行为的倾向因素是

- A. 态度
- B. 资源
- C. 政策
- D. 法律
- E. 责任

36. 某人做事总是风风火火，速度很快，脾气暴躁，缺乏耐性，而且时不时会出些错误。其



气质类型属于

- A. 胆汁质
- B. 多血质
- C. 黏液质
- D. 多动质
- E. 抑郁质

37. 《医疗机构从业人员行为规范》提出的医疗机构从业人员执业的价值目标是

- A. 为人民健康服务
- B. 发扬人道主义精神
- C. 树立大医精诚理念
- D. 以患者为中心
- E. 救死扶伤、防病治病

38. 属于医务人员自我道德评价方式的是

- A. 习惯
- B. 内心信念
- C. 传统习俗
- D. 名誉
- E. 社会舆论

39. 医生在诊疗过程中经常对患者使用医学专业术语，使患者难以理解，容易造成误解。这种医患交流的问题属于

- A. 回忆不良
- B. 沟通障碍
- C. 信息缺乏
- D. 同情不够
- E. 依从性差

40. 医患关系的实质是

- A. 具有经济性质的商业关系
- B. 具有契约性质的信托关系
- C. 具有法律性质的契约关系
- D. 具有市场性质的交换关系
- E. 具有宗教性质的文化关系

41. 适用于“主动-被动型”医患关系模式的患者群体中一般不包括

- A. 昏迷患者
- B. 婴幼儿患者
- C. 焦虑症患者
- D. 痴呆患者
- E. 精神分裂症缺乏自知力患者

42. 对疑似甲类传染病患者给以隔离所体现的公共卫生伦理原则是

- A. 互相协同原则
- B. 社会公正原则
- C. 社会公益原则
- D. 信息公开原则
- E. 全社会参与原则

43. 医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作应给予罚款处罚，其最高金额是

-
- A. 5 千元
 - B. 8 千元
 - C. 2 千元
 - D. 1 万元
 - E. 3 千元

44. 有助于患者记忆的信息沟通方式不包括

- A. 规范使用医学缩略术语
- B. 指导问题力求具体
- C. 重要医嘱首先提出
- D. 语言表达通俗易懂
- E. 归纳总结医嘱内容

45. 相对于一般契约关系而言，医生在医患关系负有更重的义务，但这些义务中不包括

- A. 监督义务
- B. 保密义务
- C. 披露义务
- D. 注意
- E. 忠实义务

46. 抗菌药物的细菌耐药率超过一定百分比时，应当慎重经验用药。该百分比是

- A. 50%
- B. 20%
- C. 10%
- D. 40%
- E. 30%

47. 目前我国提倡的活体供体器官方式是

- A. 自由买卖
- B. 推定民意
- C. 自愿捐献
- D. 家属决定
- E. 政府决定

48. 依据《精神卫生法》，给予吊销精神科医师执业证书处罚的情形是

- A. 未及时对有伤害自身危险的患者进行检查评估的
- B. 精神障碍患者对再次诊断结论有异议的
- C. 故意将非精神障碍患者诊断为精神障碍患者的
- D. 对实施住院治疗的患者未根据评估结果作出处理的
- E. 拒绝对送诊的疑似精神障碍患者作出诊断的

49. 有权对收受药物经营企业财务的医务人员做出没收违法所得的处罚单位是

- A. 卫生计生行政部门
- B. 公安机关
- C. 食品药品监督管理部门
- D. 医师协会
- E. 工商行政管理部门

50. 医疗机构临床用血管理的第一责任人是

- A. 临床用血的医师
- B. 血站

-
- C. 临床用血所在科室的负责人
D. 临床用血医师的上级医师
E. 医疗机构法定代表人
51. 医务人员必须经过省级卫生计生行政部门考核并取得相应合格证书方可从事的母婴保健服务项目是
A. 结扎手术
B. 家庭接生
C. 产前诊断
D. 婚前医学检查
E. 终止妊娠手术
52. 依据《侵权责任法》，医务人员实施手术前应当向患者说明的事项是
A. 医疗纠纷处理方式
B. 隐私保密要求
C. 替代医疗方案
D. 承担赔偿责任的情形
E. 复印病例资料范围
53. 负责向全社会发布突发公共卫生事件信息的法定单位是
A. 县级人民政府
B. 省级人民政府
C. 国务院卫生计生行政部门
D. 国务院新闻办公室
E. 设区的市级人民政府。
54. 环境污染物危险度评价中的暴露评价可以统计出
A. 某化学物在环境介质中的浓度
B. 某化学物对机体产生危害程度
C. 某化学物是否对机体产生危害
D. 危险物特征
E. 人群对某化学物暴露的强度
55. 我国卫生事业的性质是
A. 政府实行福利政策的事业
B. 政府通过购买形式为人民提供服务的事
C. 政府许可的盈利性事业
D. 政府实行一定福利政策的社会公益事业
E. 政府实行的社会公益事业
56. 关于流行病学，下列说法正确的是
A. 从个体的角度研究疾病和健康状况及其影响因素
B. 侧重研究传染病的流行特征和防制措施
C. 研究人群中疾病和健康状况的分布及其影响
D. 研究疾病在时间、空间和人间的存在方式及其发生、发展规律
E. 侧重研究慢性病的流行特征和防制措施
57. 临床预防服务的主要内容不包括
A. 化学预防.
B. 筛查
C. 健康咨询

-
- D. 免疫接种
E. 药物治疗
58. 计算患病率的分子是
- A. 观察期间某病的暴露人口数
B. 观察期间某病的新旧病例数
C. 观察期间某病的新发病例数
D. 观察开始之前某病的患病人数
E. 观察期间所有人口数
59. 反映均数抽样误差大小的指标是
- A. 变异系数
B. 标准误
C. 均数
D. 标准差
E. 全距
60. 某地区成年人的首位死因是心脏病，下列各项措施中不属于该地区优先防治策略的是
- A. 通过媒体倡导居民增加身体活动
B. 在社区人群中开展减少心脏病危险因素的咨询
C. 加强公共场所与工作场所的控烟
D. 大力发展心脏专科医院，为病人提供心脏介入治疗
E. 以高胆固醇血症和家族史为指标
61. 呈对数正态分布的数值变量资料，用来描述集中趋势的指标最好选用
- A. 几何均数
B. 众数
C. 算术均数
D. 调和均数
E. 中位数
62. 医疗保险制度的资金来源主要是
- A. 个人、保险公司、政府
B. 个人、集体、国家
C. 职工、雇主、保险公司
D. 职工、雇主、保险公司
E. 个人、单位、保险公司
63. 下列食物未煮熟时易导致食物中毒的是
- A. 赤豆
B. 婉豆
C. 荷兰豆
D. 绿豆
E. 四季豆
64. 健康促进的核心策略包括
- A. 保护环境
B. 职业卫生
C. 倡导、增权、协调
D. 疾病控制
E. 学校卫生

-
65. 免疫缺陷患者不可接种的疫苗是
- A. 灭活脊髓灰质炎疫苗
 - B. 流行性出血热疫苗
 - C. 麻疹活疫苗
 - D. 多糖疫苗
 - E. 重组乙型肝炎疫苗
66. 流行病学研究的观察法与实验法的根本区别在于
- A. 盲法
 - B. 是否有人为干预
 - C. 统计学检验
 - D. 设立对照组
 - E. 不设立对照组
67. “无论是致病、治疗，还是预防和康复都应将人视为一个整体，需要考虑各方面因素的交互作用，而不能机械地将他们分割开”。此观点所反映的医学模式是
- A. 自然哲学的医学模式
 - B. 生物-心理-社会医学模式
 - C. 神灵主义的医学模式
 - D. 机械论医学模式
 - E. 生物医学模式
68. 选定暴露和未暴露于某种因素的两种人群，追踪其各自的发病结局，比较两者发病结局的差异，从而判断暴露因素与发病有无因果关联及关联程度，该研究为
- A. 病例对照研究
 - B. 现场干预试验
 - C. 队列研究
 - D. 临床试验研究
 - E. 现况
69. 关于经济因素对健康的影响，不正确的说法是
- A. 经济因素对健康的影响是多方面的
 - B. 单纯注重经济增长将危害人类的健康
 - C. 人群收入的绝对水平决定着经济对健康的影响程度
 - D. 经济的发展应与社会发展及促进人类健康水平同步
 - E. 人群的健康水平影响经济的发展
70. 提高人群肺癌筛查检出率的首选方法是
- A. 血清肿瘤标志物
 - B. 高分辨 CT
 - C. PET-CT
 - D. 低剂量 CT
 - E. 痰细胞学检查
71. 属于支气管扩张手术治疗禁忌证的是
- A. 合并反复感染
 - B. 双下肺均存在局限性支气管扩张病变
 - C. 窦性心动过慢，阿托品试验（+）
 - D. 合并肺源性心脏病
 - E. 合并大咯血



72. 造成气流受限的病因中，最常出现肺脏弹性回缩力减弱的是

- A. 弥漫性泛细支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 慢性支气管炎
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 阻塞性肺气肿

【A2 型题】答题说明：每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

73. 男，72岁。乏力、走路不稳3个月。查体：肌张力减低，共济失调，意向性震颤，指鼻试验阳性。该患者最可能的病变部位是

- A. 小脑
- B. 皮层运动区
- C. 脑干
- D. 基底神经节
- E. 脊髓

74. 男，45岁。右利手。因头痛和言语障碍6月余就诊。头颅MRI显示左侧中央前回底部前方有占位性病变，脑膜瘤可能性大。该患者的言语障碍最可能是

- A. 失写
- B. 失读
- C. 感觉性失语
- D. 超导性失语
- E. 运动性失语

75. 男，18岁。因终末肾脏病行肾脏移植手术，其母亲为其供肾者，这种移植类型是

- A. 同基因移植
- B. 同种异体移植
- C. 异种移植
- D. 同系移植
- E. 自体移植

76. 男，48岁。右季肋区疼痛3月。既往有乙型病毒性肝炎病史10年。B超检查见肝右叶巨大肿块。血AFP增高。符合该肿瘤病理学特点的是

- A. 肿瘤组织间质较多
- B. 癌细胞呈腺管状排列
- C. 癌细胞分泌黏液且血管少
- D. 癌细胞与肝细胞类似
- E. 发生于肝内胆管上皮最多见

77. 小李，男，25岁。硕士研究生毕业后参加工作。半年来对上级领导布置的任务总感觉不能胜任，屡屡出错，受到多次批评后内心受挫，选择了辞职。小李的这种选择在应激反应属于

- A. 认知反应
- B. 生理反应
- C. 情绪反应
- D. 行为反应
- E. 防御反应

78. 女，45岁。大学教授。因车祸导致颅脑损伤，智力测验显示其智商为85分。同时有一

位农民测得智商也是 85 分。心理治疗师认为前者的智力出现了问题，而后者正常。这一判断所遵循的原则是

- A 客观性原则
- B. 中立性原则
- C. 操作性原则
- D. 保密性原则
- E. 标准化原则

79. 一位服用了 60 多片安定的精神病患者被送到医院急救，患者父母表示无力承担抢救费用。按照急救伦理的要求，医生应该选择的处理措施是

- A. 在家属和院内上级领导的同意下，赶快救治
- B. 在征得患者父母同意的情况下，放弃治疗
- C. 放弃治疗，让患者父母将其接回家
- D. 向民政部门反映，争取社会支持，并由他们决定是否抢救
- E. 仅给予患者家庭能够承受费用的支持疗法

80. 主治医师邱某经过抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训并考核合格后，被授予限制使用级抗菌药物处方权。但不久，邱某因违反《抗菌药物临床应用管理办法》的相关规定，受到医院警告并限制其上述处方权。医院处理邱某的依据是

- A. 多次使用非限制使用级抗菌药物
- B. 使用价格相对较高的抗菌药物
- C. 在紧急情况下越级使用抗菌药物
- D. 无正当理由开具抗菌药物超常处方 3 次以上
- E. 在门诊使用限制使用级抗菌药物

81. 某人因病住院 20 天，治疗费用共 53000 元，结算费用时被告知其中 50000 元以下的部分由医保支付，另外 3000 元需个人支付，该案例中的 50000 是

- A. 起付线
- B. 封顶线
- C. 自付线
- D. 共同付费
- E. 封底线

82. 某医师从医院辞职到一家药品生产企业从事营销工作，后因事业不顾，想重回医院工作，但因其中止执业活动已满法定期限被卫生行政部位注销注册。该法定期限是

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 1 年
- E. 6 个月

83. 某中年男性因突发急症在大街上摔倒并昏迷，由路人送至附近医院，被确诊为脑出血，急需手术，但医务人员无法联系到其亲属。在此情况下，可以决定为其急诊手术的人员是

- A. 医院所在地民政部门负责人
- B. 医院所在地派出所负责人
- C. 为其接医师的上级医师
- D. 院长或其授权人
- E. 目击者

84. 若用统计图直观地表示某城市在 8 年中肝炎的发病率随时间的变化情况，宜选择

-
- A. 圆图
 - B. 直条图
 - C. 普通线图
 - D. 直方图
 - E. 散点图

85. 某糖尿病患者为了控制血糖，在医生的建议下准备和营养师一起定制一份饮食计划。她虽然知道饮食控制的好处，但总认为无法管住自己，计划难以实施。对于这样患者的干预重点是

- A. 要提高其自身效能
- B. 培养行为能力
- C. 提高结果预期
- D. 提供社会支持
- E. 建立支持性环境

86. 已知某省山区、丘陵、湖区婴幼儿体格发育有较大的差异，现需制定该省婴幼儿体格发育有关指标的参考值范围，抽样方法最好采取

- A. 分层抽样
- B. 整群抽样
- C. 系统抽样
- D. 机械抽样
- E. 单纯随机抽样

87. 某煤矿职工医院欲探讨二、三期矽肺患者肺部的阴影密度级别 (+、++、+++、++++) 间是否不同，可选择

- A. 线性回归
- B. 成组设计比较的秩和检验
- C. 直线相关
- D. 两样本 t 检验
- E. 四格表 χ^2 检验

88. 某医师为评价某新药对流感的治疗效果，共收治了 100 例流感病人，一周后治愈的有 90 例，由此认为该新药对流感疗效显著。针对此实验，正确的观点是

- A. 结论正确，因为治愈率达 90%
- B. 结论不能肯定，因为未作重复试验
- C. 结论不能肯定，因为未设对照组
- D. 结论不能肯定，因为未作统计学处理
- E. 结论不能肯定，因为实验样本含量较少

89. 女，43 岁。发热、咳嗽、少量脓痰 2 周。既往健康。查体未见明显异常。血常规大致正常，ESR45mm/h。胸部 X 线片示右上肺渗出性病变更不规则空洞，无液平。为明确诊断，宜首选的检查是

- A. 痰细菌培养+药敏
- B. 支气管镜肺活检
- C. 痰涂片抗酸染色
- D. 痰涂片革兰染色
- E. PPD 皮试

90. 男，75 岁。慢性阻塞性肺疾病急性加重反复出现，抗感染治疗时，为覆盖铜绿假单胞菌，下列抗菌药物中宜首选的是

-
- A. 莫西沙星
 - B. 阿米卡星
 - C. 头孢他啶
 - D. 阿奇霉素
 - E. 阿莫西林

91. 男，56岁。因“肺部感染、休克”入监护室治疗。血气分析提示该患者“代谢性酸中毒，I型呼吸衰竭”为保护患者组织，此时不宜快速纠正酸中毒，其主要原因在于酸中毒时

- A. 组织氧摄取能力增加
- B. 血红蛋白结合氧增加
- C. 肺部获得更多的氧
- D. 组织氧耗量减少
- E. 导致氧离曲线右移

92. 女，79岁。咳嗽、咳痰20年，气促10年，加重5天，查体：桶状胸，呼气相延长，血气分 $pH 7.0$, $PaO_2 55\text{mmHg}$, $PaCO_2 54\text{mmHg}$, 该患者的发病机制，下列不包括

- A. 阻塞性肺通气功能障碍
- B. 弥散功能障碍
- C. 无效腔增加
- D. 限制性通气功能障碍
- E. 通气/血流比例失衡

93. 女，37岁。因阵发性室上性心动过速行射频消融治疗，术中患者突然出现胸闷、烦躁、呼吸困难。查体： $BP 80/70\text{Hg}$ ，颈静脉怒张，两肺呼吸音清，心界向两侧扩大。心率120次/分，律齐。各瓣膜听诊区未闻及杂音，奇脉（+）。导致其临床表现的机制是

- A. 心排血量增加，静脉压升高
- B. 心排血量不变，静脉压升高
- C. 心排血量下降，静脉压降低
- D. 心排血量增加，静脉压降低
- E. 心排血量下降，静脉压升高

94. 男，16岁。阵发性心悸1年余，突发突止，发作期间心电图正常，10分钟前再次发作，心电图示快速、规则的QRS波群，形态正常，未见明显P波。急诊医师在患者右胸锁乳突肌内缘甲状软骨水平按摩数秒钟后，心律突然恢复正常。该治疗手法的作用机制是

- A. 减弱心迷走神经紧张
- B. 加强心迷走神经冲动
- C. 加强心交感神经冲动
- D. 原因不明
- E. 兴奋颈动脉体

95. 男，55岁。反复活动时胸痛，快步行走及上楼梯可诱发，休息可缓解。冠状动脉造影见前降支阻塞80%。血管病变的始动环节是

- A. 糖尿病
- B. 高血压
- C. 上皮细胞受损及功能失调
- D. 内皮细胞受损及功能失调
- E. 内皮下脂质沉积

96. 男，40岁。上腹部不适伴纳差1个月。既往体健。胃镜检查结果为黏膜相关性淋巴样组织淋巴瘤。与该病发生密切相关的病原体是

-
- A. 军团菌
 - B. 粪肠球菌
 - C. 幽门螺杆菌
 - D. 产气肠杆菌
 - E. 大肠埃希菌

97. 男，70岁。上腹痛一年，进食后加重，大便10次/天，可见脂肪滴。查体：上腹中部压痛(+)。腹部B超：胰腺多发钙化灶。需要给予

- A. 钙通道阻滞剂
- B. 质子泵抑制剂
- C. 抗胆碱药物
- D. 胰酶制剂
- E. H2受体拮抗剂

98. 男，72岁。反酸、烧心36年。呼吸困难，乏力2个月。间断口服质子泵抑制剂治疗，起初有效，近2个月效果不佳。胃镜检查示：食管下段及贲门区隆起溃疡性病变，质脆、易出血。最有可能的活组织检查为

- A. 淋巴瘤..
- B. 神经内分泌肿瘤
- C. 胃肠间质瘤
- D. 鳞癌
- E. 腺癌

99. 男，33岁。消化性溃疡反复发作并出血3年。再出血1周，内科治疗无效，行手术治疗。术中见胃皱襞显著增厚，组织病理学检查发现明显的壁细胞增生。最可能导致该病变的内源性物质是

- A. 转化生长因子 α
- B. 促胃液素
- C. 促胰液素
- D. 生长抑素
- E. 乙酰胆碱

100. 男，68岁。恶心、上腹隐痛、呕吐少量咖啡样液体2天。高血压、血脂异常病史2年，长期口服阿司匹林100mg/d。胃镜检查可见胃窦黏膜多发糜烂，表面附着血性黏液。最适应的治疗药物是

- A. 多潘立酮
- B. 奥美拉唑
- C. 枸橼酸铋钾
- D. 硫糖铝
- E. 法莫替丁

101. 女，70岁。冠心病、高血压、糖尿病患者。近1个月调整用药为阿司匹林、比索洛尔、辛伐他汀、二甲双胍。近3天双下肢无力及疼痛，双侧足背动脉搏动一致。实验室检查：血CK2200U/L, cTnI 0.01ng/ml, 血肌酐 368 μ mol/L。出现双下肢无力及疼痛的最可能原因是

- A. 糖尿病病足
- B. 主动脉夹层
- C. 间歇性跛行
- D. 横纹肌溶解，
- E. 腰椎间盘突出症

102. 糖尿病患者，女，65岁，家庭主妇，初中文化程度。医生给予的饮食建议，容易理解和执行的说法是

- A. “您每天摄入热量不能越过1200千卡。”
- B. “您必须严格控制饮食，要低盐、低脂、低糖饮食。”
- C. “每顿饭主食2两，少吃油腻的”。
- D. “不吃甜食。稀饭、甘蔗、西瓜、甜饮料，少吃肉、油，可吃点粗粮”
- E. “您一定要管住自己的嘴，原来爱吃的都不能吃了。”

103. 某心外科医生在实施一例先天性心脏病手术之前的晚上，在自己脑海中反复想象手术的过程、路径以及手术以外的应对措施等，这种思维方式是

- A. 聚合思维
- B. 形象思维
- C. 发散思维
- D. 抽象思维.
- E. 创造思维

104. 男，41岁。腹泻1天。1天前进食海产品后出现腹泻。大便30余次，为米泔样便。查体：P110次/分，BP80/50mmHg，皮肤干皱，弹性稍差，眼窝凹陷。血常规：Hb162g/L，WBC13.7×10⁹/L，N0.85，PLT142×10⁹/L。该患者腹泻的发生机制是

- A. 肠黏膜细胞内cAMP水平升高，过度分泌水及电解质
- B. 胆汁分泌减少引起胃肠功能紊乱
- C. 主要由于结肠、乙状结肠肠管麻痹
- D. 主要由于脏器的实质性损害
- E. 与致病菌引起的侵袭性病变有关

105. 女，18岁。持续发热10天，于9月2日来诊，体温逐日升高，伴乏力，纳差。查体：T39.8℃，P80次/分，精神萎靡，腹部可见6个充血性皮疹，腹部胀气，脾肋下可及。实验室检查：血WBC3.7×10⁹/L。此患者所患疾病的主要病理特点是

- A. 基本病变是小血管炎
- B. 全身单核-吞噬细胞系统增生性反应
- C. 小肠黏膜苍白、水肿
- D. 主要病变在淋巴结和胸腺
- E. 肠黏膜呈弥漫性纤维蛋白渗出性炎症

106. 男，40岁。右下肢肿胀、剧痛3小时。1天前用粪便在农田施肥时，右足被扎伤，半夜感胀裂样痛，症状加重，出现下肢肿胀，皮肤由紫红变成黑紫、水肿有水疱。查体：局部皮下有捻发音，伤口处有的血性浆液渗出。最可能的致病菌是

- A. 乙型溶血性链球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. 梭状芽孢杆菌
- E. 结核杆菌

107. 女，50岁。右乳头皮肤脱屑、结痂半年。去除痂皮可见糜烂样创面，刮片细胞学检查：可见大而异型、胞质透明的肿瘤细胞。这种细胞称为

- A. 镜影细胞
- B. L&H型细胞
- C. 陷窝细胞
- D. Paget细胞

E. 多核瘤巨细胞

108. 男, 70岁。右侧肢体动作迟缓伴震颤半年。查体: 右侧肢体静止性震颤, 肌张力齿轮样增高。病变可能的部位是

- A. 大脑皮质
- B. 黑质
- C. 小脑
- D. 内囊
- E. 脑桥

109. 女, 30岁。腹痛、腹泻伴里急后重3天。最初为稀便, 2天后为黏液脓血便, 偶见片状灰白色膜状物排出。此病变最可能的炎症类型是

- A. 纤维素性炎
- B. 变质性炎
- C. 浆液性炎
- D. 出血性炎
- E. 化脓性炎

110. 女, 19岁。因急性白血病接受骨髓移植治疗, 术后被安置于无菌病房中, 根据病情, 需限制亲属探视, 在此期间患者常常出现心情烦躁、不安, 针对此情况, 心理治疗师指导其采用冥想结合深呼吸的方法来改善自己的情绪, 这种应对方式属于

- A. 取得社会支持
- B. 消除应激来源
- C. 调整认知评价
- D. 心理防御机制
- E. 自我调节放松

111. 某电视台编辑求助于一家心理治疗中心, 希望在该电视台上播放韦氏智力测验的具体内容, 以引起公众对心理学的兴趣, 但被心理中心的工作人员婉言拒绝, 该工作人员遵循的原则是

- A. 保密原则
- B. 稳定性原则
- C. 标准化原则
- D. 回避原则
- E. 客观原则

112. 男, 56岁。上腹胀痛不适10年, 常于进食后半小时加重, 可自行缓解。近3个月来体重减轻5kg, 胃镜检查示胃小弯侧直径3cm溃疡病灶, 取活组织标本行病理检查。能够诊断溃疡病灶属恶性的病理形态学依据是

- A. 细胞质出现空泡
- B. 胞质黏液明显增多
- C. 细胞核大小一致
- D. 核仁清楚
- E. 细胞异型性明显

113. 男, 13岁, 学生。持续畏寒、发热1周, 神志不清半天。病前有右足刺伤史。查体: T39.5°C, P123次/分, BP65/45mmHg, 右足跟部红肿, 血常规 WBC24.3×10⁹, NO.89, 10.11。导致本病最可能的病原体是

- A. 革兰阴性菌
- B. 真菌

C. 革兰阳性菌

D. 病毒

E. 寄生虫

114. 女，40岁。右上腹胀痛伴畏寒、发热2天，巩膜黄染1天。查体：T39℃，P100次/分，右上腹部压痛、反跳痛及肌紧张明显，肝区叩击痛阳性，血WBC18.2×10⁹/L，NO.85。B超示胆囊及胆总管结石，该患者最可能感染的致病菌是

A. 草绿色链球菌

B. 大肠埃希菌

C. 金黄色葡萄球菌

D. 铜绿假单胞菌

E. 肺炎链球菌

115. 某村卫生室私自从“不法药贩”处购入药品用于患者的治疗，险些造成患者死亡。事发现后，经有关部门调查检测，认定该药品为假药。该认定依据的事实是

A. 药品标签未标明有效期

B. 药品擅自添加着色剂

C. 直接接触药品的包装材料未经批准

D. 药品超过有效期

E. 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符

【A3/A4型题】答题说明：以下提供若干个病例，每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

(116~117题共用题干)

男，18岁。双下肢及颜面水肿1周。尿沉渣镜检：RBC0~2个/HP，尿蛋白定量12.2g/d。血ALB18g/L，Scr79μmol/L，ANA(-)，乙型肝炎病毒标志物均(-)。

116. 该患者最可能的肾脏病理类型是

A. 毛细血管内增生性肾小球肾炎

B. 微小病变型肾病

C. 膜性肾病

D. 膜增生性肾小球肾炎

E. 局灶节段性肾小球硬化

117. 如果经足量糖皮质激素治疗12周无效，其病理类型最可能是

A. 毛细血管内增生性肾小球肾炎

B. 微小病变型肾病

C. 膜性肾病

D. 膜增生性肾小球肾炎

E. 局灶节段性肾小球硬化

(118~120题共用题干)

用钼靶X线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验，分别检查了100名经活检确诊的乳腺癌妇女和100名未患乳腺癌的妇女，结果如下表：

活检确诊结果			
筛检结果	乳腺癌	非乳腺癌	合计
阳性	64	16	80
阴性	36	84	120
合计	100	100	200

118. 此项筛检试验中灵敏度为

- A. 16%
- B. 84%
- C. 64%
- D. 36%
- E. 74%

119. 此项筛检试验中特异度为

- A. 16%
- B. 84%
- C. 64%
- D. 36%
- E. 74%

120. 此项筛检试验的粗一致率为

- A. 36%
- B. 16%
- C. 84%
- D. 74%
- E. 64%

(121~123 题共用题干)

连某因患严重的躁狂抑郁障碍，正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化，患者出现伤人毁物等行为，医院在没有其他可替代措施的情况下，对其实施了约束身体的措施，但实施后没有及时通知连某的监护人。连某的父亲作为监护人探视时，看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。

121. 依照《精神卫生法》对患者连某实施的约束行为的性质属于

- A. 治疗性措施
- B. 惩罚性措施
- C. 保护性医疗措施
- D. 诊断性措施
- E. 警告性措施

122. 对患者连某实施身体约束而未告知其监护人的做法，侵犯的患方权利是

- A. 生命权
- B. 健康权
- C. 认知权
- D. 知情权
- E. 名誉权

123. 该案例中所形成的医患关系模式是

- A. 主动-被动型
- B. 指导-合作型
- C. 契约许可型
- D. 指导参与型
- E. 共同参与型

(124~125 题共用题干)

男，40岁。体检发现空腹血糖升高2个月。2次查空腹血糖分别为7.8mmol/L、7.4mmol/L，

无口干、多饮、多食、多尿、体重下降。查体：身高 170cm，体重 90kg，BMI31.1，余无异常。
实验室检查：HbA1c7.8%。

124. 该患者首选的治疗药物是

- A. 罗格列酮
- B. 胰岛素
- C. 阿卡波糖
- D. 二甲双胍
- E. 格列苯脲

125. 药物治疗 2 个月后，空腹血糖降至 6.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 9~10mmol/L，拟采用药物联合治疗，首选的治疗药物是

- A. 罗格列酮
- B. 格列苯脲
- C. 胰岛素
- D. 二甲双胍
- E. 阿卡波糖

【B 型题】答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(126~127 题共用备选答案)

- A. 阿卡波糖
- B. 胰岛素
- C. 格列美脲
- D. 比格列酮
- E. 二甲双胍

126. 主要减少肝糖输出的药物是

127. 属于过氧化物酶增殖体活化因子受体 γ 激动剂的是

(128~130 题共用备选答案)

- A. 散点图
- B. 圆图
- C. 直条图
- D. 直方图
- E. 线图

128. 用于描述连续型变量资料频率分布的统计图是

129. 可用于描述两连续型变量之间相关关系的统计图是

130. 描述事物内部各组成部分所占比重宜使用

(131~132 题共用备选答案)

- A. 支气管哮喘
- B. 血清病
- C. 药物过敏性休克
- D. 接触性皮炎
- E. 自身免疫性溶血性贫血

131. 属于 II 型超敏反应的疾病是

132. 属于 III 型超敏反应的疾病是

(133~135 题共用备选答案)

- A. 主要为收缩压升高
- B. 收缩压与舒张压均升高
- C. 主要为舒张压升高
- D. 收缩压降低，舒张压升高
- E. 收缩压升高，舒张压可降低

133. 严重甲状腺功能亢进患者的动脉血压变化特点是

134. 正常老年人动脉血压的生理性变化特点是主要为

135. 以小动脉硬化为主的患者动脉血压变化特点是

(136~137 题共用备选答案)

- A. 列兵样排列
- B. 形成管状结构
- C. 形成乳头状结构
- D. 有角化珠
- E. 有假菊形团结构

136. 最符合小细胞癌组织学特点的是

137. 最符合高分化鳞癌组织学特点的是

(138~139 题共用备选答案)

- A. 氧化与磷酸化的偶联
- B. CO 对电子传递的影响
- C. 能量的贮存与利用
- D. $2H^+$ 与 $1/2O_2$ 的结合
- E. 乳酸脱氢酶催化的反应

138. 与 ADP 和 ATP 相互转变相关的过程是

139. 与 ATP 生成有关的主要过程是

(140~141 题共用备选答案)

- A. 直肠息肉形成
- B. 脾脏白色锥形病灶
- C. 回盲部肠腔狭窄
- D. 胃壁溃疡形成
- E. 肝脏肿大

140. 肺外结核病最常引起的形态改变是

141. 慢性肺淤血可引起的脏器改变是

(142~143 题共用备选答案)

- A. 丙酮酸羧化
 - B. 乙酰 CoA 缩合
 - C. 糖原分解
 - D. 黄嘌呤氧化
 - E. 糖原合成
142. 生成酮体的中间反应是
143. 三羧酸循环中草酰乙酸的来源是



(144~145 题共用备选答案)

- A. 开具抗菌药物处方牟取不正当利益
- B. 发生抗菌药物不良事件
- C. 出现开具抗菌药物超常处方 3 次以上且无正当理由
- D. 因紧急情况越级使用抗菌药物
- E. 使用的抗菌药物明显超出规定用量

144. 医疗机构对医师提出警告并限制其特殊使用级抗菌药物处方权的情形是

145. 医疗机构取消医师抗菌药物处方权的情形是

(146~148 题共用备选答案)

- A. 勇担风险，团结协作
- B. 掌握手术指征，动机纯正
- C. 以健康、稳定的情绪影响患者
- D. 对症下药，剂量安全
- E. 减轻痛苦，加速康复

146. 手术后治疗的伦理要求是

147. 心理治疗的伦理要求是

148. 临床急救的伦理要求是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 抗-HBs
- B. 抗-HBc IgM
- C. 抗-HBc IgG
- D. 抗-HBe
- E. 抗-HDV

149. 乙型肝炎的保护性抗体是

150. 提示体内乙型肝炎病毒处于复制状态的抗体是

第二单元

【A1型题】答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 中央型肺癌伴纵隔、肺门多发淋巴结肿大最常见于

- A. 鳞癌
- B. 大细胞癌
- C. 小细胞癌
- D. 腺癌
- E. 类癌

2. 属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂的是

- A. 硝苯地平
- B. 氨氯地平
- C. 非洛地平
- D. 哌替帕胺
- E. 维拉帕米

3. 不符合慢性肺源性心脏病心电图表现的是

- A. 电轴右偏
- B. $SV_1+RV_5 \geq 1.05mV$
- C. 右束支传导阻滞
- D. V_1 和 V_2 导联出现 QS 波
- E. 肺型 P 波

4. 结核性胸膜炎患者，除抗结核治疗外，减轻胸膜肥厚最重要的措施是

- A. 反复胸腔穿刺抽液
- B. 胸腔内注入抗结核药物
- C. 胸腔内注射糜蛋白酶
- D. 口服糖皮质激素
- E. 胸腔内注射尿激酶

5. 诊断支气管扩张首选的检查是

- A. 胸部超声
- B. 胸部高分辨 CT
- C. 支气管造影
- D. 胸部 X 线片
- E. 胸部磁共振

6. 目前用于判断慢性阻塞性肺疾病严重程度的肺功能指标是

- A. FEV₁ 占预计值百分比
- B. FVC 占预计值百分比
- C. RV/TLC(残总比)
- D. MVV 占预计值百分比
- E. FEV₁/FVC(一秒率)

7. 急性呼吸窘迫综合征所致顽固性低氧血症的主要机制是

- A. 限制性通气功能障碍
- B. 弥散功能障碍
- C. 通气/血流比例失衡



-
- D. 分流率增加
E. 呼吸功增加
8. 有关气道高反应性 (AHR) 的描述正确的是
- A. AHR 是哮喘发病的重要神经机制
 - B. 气道炎症是导致 AHR 的重要机制
 - C. AHR 检测阳性者可诊断支气管哮喘
 - D. 肺泡巨噬细胞激活后可降低 AHR
 - E. AHR 不受遗传因素的影响
9. 急性肺水肿最特异的临床表现为
- A. 肺动脉瓣区第二心音亢进
 - B. 心尖区收缩期杂音
 - C. 咳大量粉红色泡沫痰
 - D. 左肺底湿啰音
 - E. 气促、发绀
10. 支气管哮喘患者发作时禁用的药物是
- A. 吗啡
 - B. 氨茶碱
 - C. 泼尼松
 - D. 肾上腺素
 - E. 沙丁胺醇
11. 仅对细胞外碱性环境中的结核菌有杀菌作用的药物是
- A. 乙胺丁醇
 - B. 利福平
 - C. 异烟肼
 - D. 吡嗪酰胺
 - E. 链霉素
12. 肺癌空洞的典型 X 线表现是
- A. 薄壁空洞，形状不规则
 - B. 厚壁空洞，内壁光滑
 - C. 薄壁空洞，内壁光滑
 - D. 厚壁空洞，内壁凹凸不平
 - E. 厚壁空洞，内有液平
13. 慢性阻塞性肺疾病的慢性气道炎症最主要的效应细胞是
- A. 嗜酸性粒细胞
 - B. 树突状细胞
 - C. 巨噬细胞
 - D. 中性粒细胞
 - E. 淋巴细胞
14. 最易引起急性心力衰竭的心律失常是
- A. 窦性心动过缓
 - B. 一度房室传导阻滞
 - C. 偶发室性期前收缩
 - D. 快速心房颤动
 - E. 偶发房性期前收缩
- 
- JINYINGJIEM.COM

15. 能改善稳定型心绞痛患者临床预后的是

- A. 尿激酶
- B. 阿司匹林
- C. 速效救心丸
- D. 硝酸甘油
- E. 利多卡因

16. 治疗心室停搏的首选药物是

- A. 胺碘酮
- B. 利多卡因
- C. 多巴酚丁胺
- D. 肌苷
- E. 肾上腺素

17. 恶性高血压的病理特征是

- A. 肾毛细血管纤维样坏死
- B. 大、中动脉粥样硬化
- C. 微血管炎
- D. 肾脏纤维化
- E. 肾小动脉纤维样坏死

18. 右心衰竭时水肿形成的主要机制是

- A. 血浆胶体渗透压降低
- B. 小动脉壁通透性增高
- C. 毛细血管流体静压升高
- D. 黏多糖在组织间隙内沉积
- E. 淋巴液回流受阻

19. 病毒性心肌炎的确诊有赖于

- A. 血肠道病毒核酸阳性
- B. 血清柯萨奇 B 组病毒 IgG1:640
- C. 心肌组织内病毒的检出
- D. 血 C 反应蛋白水平增高
- E. 血清柯萨奇 B 组病毒 IgM1:320 以上

20. 左心衰竭患者合并右心衰竭后，可能减轻左心衰竭时的临床表现是

- A. 恶心
- B. 喘憋
- C. 肝肿大
- D. 颈静脉充盈
- E. 下肢水肿

21. 扩张型心肌病典型的超声心动图改变是

- A. 收缩期心尖部向外膨出
- B. 瓣膜增厚、钙化、僵硬、瓣口开放受限
- C. 心腔扩大，室壁运动弥漫减弱，瓣口开放小
- D. 收缩期二尖瓣前叶向前运动
- E. 舒张期室间隔厚度与左室后壁之比 ≥ 1.3

22. 心尖区触及舒张期震颤提示存在

- A. 主动脉瓣狭窄



-
- B. 动脉导管未闭
C. 主动脉瓣关闭不全
D. 二尖瓣狭窄
E. 三尖瓣关闭不全
23. 急性肾小球肾炎水肿的主要机制为
A. 肾小球滤过率下降，水钠潴留
B. 低蛋白血症
C. 毛细血管通透性增加
D. 继发性醛固酮增多症
E. 抗利尿激素增加
24. 最易发生血栓合并症的肾病综合征病理类型是
A. 微小病变肾病
B. 系膜增生性肾炎（非 IgA 肾病）
C. 系膜增生性 IgA 肾病
D. 膜性肾病
E. 局灶节段性肾小球硬化
25. 协助诊断肾挫伤，首要的检查是
A. 血肌酐
B. 尿常规
C. 静脉尿路造影
D. 腹部 CT 平扫
E. 血细胞比容
26. 老年人无痛性肉眼血尿，首先应考虑
A. 泌尿系肿瘤
B. 泌尿系畸形
C. 泌尿系感染
D. 泌尿系结石
E. 泌尿系结核
27. 鹿角形结石引起泌尿道的病理生理改变，最严重的后果是
A. 尿路梗阻
B. 尿路感染
C. 尿路上皮恶变
D. 肾积水
E. 尿毒症
28. 下列有关急进性肾小球肾炎的描述，正确的是
A. II 型多伴循环免疫复合物阳性
B. III 型多伴血清抗肾小球基底膜抗体阳性
C. 病理改变特征为系膜细胞重度增生
D. 光镜下改变是分型的主要依据
E. I 型多伴血清抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
29. 前列腺癌筛查最常用的方法是
A. 盆腔 CT
B. 盆腔 MRI
C. 前列腺特异性抗原检测

-
- D. 前列腺穿刺
E. 直肠指检
30. 前列腺增生患者最重要的症状是
A. 尿潴留
B. 排尿困难
C. 尿失禁
D. 无痛性肉眼血尿
E. 尿频、尿急、尿痛
31. 前列腺癌（T1b、T2 期）的最佳治疗方法是
A. 应用促黄体释放激素类似物（LHRH-A）缓释剂
B. 睾丸切除
C. 根治性前列腺切除
D. 抗雄激素治疗
E. 化疗
32. 慢性肾小球肾炎，GFR65ml/min，最主要的治疗是
A. 应用 β 受体阻滞剂
B. 应用 α -酮酸
C. 低蛋白饮食
D. 应用包醛氧化淀粉
E. 应用 ACEI
33. 有关糖尿病的诊断，正确的是
A. 空腹血糖升高是重要的诊断指标
B. 空腹血糖正常可排除糖尿病
C. 两次 OGTT 仍不能诊断时应作第 3 次
D. 糖耐量减低是糖尿病的一个亚型
E. 尿糖阴性可排除糖尿病
34. 可选择放射性核素治疗的疾病是
A. 肾上腺皮质功能减退症
B. 原发性甲状旁腺功能亢进症
C. 原发性甲状腺功能亢进症
D. 原发性甲状腺功能减退症
E. 特发性中枢性尿崩症
35. 下列提示糖尿病微血管病变的是
A. 足部溃疡
B. 高血压
C. 脑卒中
D. 眼底出血
E. 心肌梗死
36. 无功能性垂体腺瘤可能分泌的是
A. α -亚单位
B. 黄体生成素
C. 促甲状腺激素
D. 泌乳素
E. 生长激素

37. 慢性骨髓炎的治疗原则不包括

- A. 摘除死骨
- B. 清除瘢痕和肉芽
- C. 消灭无效腔
- D. 改善局部血液循环
- E. 切除新生包壳 .

38. 对肱骨外上髁炎有诊断意义的检查是

- A. Mills 征
- B. Thomas 征
- C. Spurling 试验
- D. Dugas 征
- E. “4”字试验

39. 肱骨髁上骨折后出现手指不能内收、外展，夹纸试验阳性，最可能损伤的神经是

- A. 腋神经
- B. 正中神经
- C. 桡神经 .
- D. 肌皮神经
- E. 尺神经

40. 骨折愈合过程中，属于血肿机化演进期表现的是

- A. 多出现软骨内化骨
- B. 出现无菌性炎症反应
- C. 可形成环状骨痂、髓内骨痂
- D. 可形成内骨痂、外骨痂
- E. 出现膜内化骨

41. 胫骨中下段多段闭合性骨折功能复位后发生骨不愈合，最可能的原因是

- A. 骨折端血液供应差
- B. 未用促骨折愈合药物
- C. 未达到解剖复位
- D. 功能锻炼不够
- E. 骨折端软组织嵌入

42. 骨关节炎镇痛治疗首选

- A. 口服阿司匹林
- B. 口服氨基葡萄糖
- C. 关节内注射透明质酸钠
- D. 关节内注射激素
- E. 口服对乙酰氨基酚

43. Allen 试验主要用于检查

- A. 手部肌腱损伤情况
- B. 手指末端血运情况
- C. 神经损伤后的恢复情况
- D. 手部神经损伤程度
- E. 桡尺动脉的通畅和相互吻合情况

【A2 型题】答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。



44. 男，35岁。2周前发热、咳嗽、咳黄痰，经抗炎治疗后好转。现再次高热、咳嗽、胸闷，查体：T39.5℃，P115次/分，R24次/分，气管右移，左侧语颤减弱，叩诊实音，呼吸音消失，血常规 WBC22×10⁹/L。最有效的治疗措施是

- A. 胸腔闭式引流
- B. 胸廓成形术
- C. 胸膜剥脱术
- D. 静脉点滴广谱抗生素。
- E. 胸腔内注入抗生素。

45. 女，58岁。发热、左胸痛3天。查体：T37.5℃，BP150/90mmHg。左下肺呼吸音减弱，可闻及双相摩擦音。心率100次/分。该患者最可能的诊断是

- A. 肺炎
- B. 自发性气胸
- C. 心肌梗死
- D. 肺栓塞
- E. 胸膜炎

46. 女，34岁。寒战、高热、咳血痰1周。2周前干农活时右小腿外伤。查体：T39.7℃。神志清楚，精神差。双肺未闻及干湿性啰音，右外踝上方可见小脓疮。血常规 WBC17×10⁹/L，NO.95，胸部X线片发现右下肺、左上肺类圆形阴影，其内可见空洞及液平。该患者最可能的诊断是

- A. 血源性肺脓肿
- B. 真菌性肺炎
- C. 吸入性肺脓肿
- D. 肺结核
- E. 革兰阴性杆菌肺炎

47. 男，37岁。1周来咳嗽、寒战、高热，最高体温40℃。.血 WBC15.2×10⁹/L，NO.91，经阿莫西林抗感染治疗后体温下降不明显，逐渐出现呼吸急促。半月前颈部皮肤疖肿，自行结痂。胸部X线片示双肺可见多发直径2~3cm的边缘模糊的类圆形阴影，其内可见空洞。下列检查对明确诊断意义最大的是

- A. 痰涂片革兰染色
- B. 支气管镜
- C. 动脉血气分析
- D. 胸部CT
- E. 血培养

48. 男，50岁。咳嗽、间断咯血3个月，咳大量脓痰伴发热1周来诊。吸烟史30年，胸部X线片示左下肺阴影伴空洞，洞壁厚薄不一，有液平，诊断为肺脓肿，该患者应首先考虑的基础疾病是

- A. 肺结核
- B. 肺血管炎
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管扩张
- E. 支气管囊肿

49. 男，45岁。间断咳嗽2年，每年均于秋季出现，干咳为主，夜间明显，伴憋气，常常影响睡眠，白天症状常不明显。使用多种药物抗感染治疗无效，持续1~2个月后症状可自行

消失。本次入秋后再次出现上述症状，体格检查未见明显异常。胸部 X 线片未见明显异常，肺通气功能正常。为明确诊断，宜采取的进一步检查措施是

- A. 支气管镜
- B. 睡眠呼吸监测
- C. 胸部 CT
- D. 支气管激发试验
- E. 血气分析

50. 男，18岁，学生。咳嗽、发热1月余，多为干咳，下午3时发热，体温38.0℃，可自行退热，无咯血。发病以来体重下降3kg，胸部X线片：右肺门处可见密度增高的团块影。青霉素治疗半月未见好转。查体：T37.3℃，消瘦，双肺未闻及干湿啰音。该患者最可能的诊断是

- A. 结节病
- B. 肺门淋巴结核
- C. 右肺脓肿
- D. 肺部真菌感染
- E. 淋巴瘤

51. 男，20岁。突发右侧胸痛伴气短1天入院。体检示右胸叩诊呈鼓音。该患者最可能出现的胸部X线片表现是

- A. 膈疝
- B. 气胸
- C. 少量胸腔积液
- D. 肺气肿
- E. 巨大肺大疱

52. 女，35岁，间断咳嗽、咳痰伴咯血20年，行HRCT检查示右中叶支气管囊状扩张，其余肺叶未见异常。今日再次咯血，量约200ml，给予静脉滴注垂体后叶素治疗，效果欠佳。该患者宜选择的最佳治疗措施为

- A. 静脉滴注鱼精蛋白
- B. 换用酚妥拉明静脉滴注
- C. 支气管动脉栓塞
- D. 支气管镜下止血
- E. 手术切除病变肺叶

53. 男，67岁，咳嗽、咳痰20年，加重伴气短1周。查体：T36.8℃，双肺呼吸音减弱，语音震颤减弱，叩诊呈过清音。该患者最可能的诊断是

- A. 气胸
- B. 心力衰竭
- C. 慢性阻塞性肺疾病
- D. 支气管扩张
- E. 支气管哮喘

54. 男，20岁。持续喘息发作24小时来急诊，既往哮喘病史12年。查体：端坐呼吸，大汗淋漓，发绀，双肺布满哮鸣音。动脉血气分析示：pH7.21，PaCO₂70mmHg，PaO₂55mmHg。此时应紧急采取的治疗措施是

- A. 机械通气
- B. 使用广谱抗生素
- C. 静脉滴注糖皮质激素

D. 静脉注射氨茶碱

E. 补充液体

55. 女，58岁。咳嗽、痰中带血、左胸痛1个月，胸部X线片示左侧大量胸腔积液。查体：左侧呼吸音消失、语颤减弱。有助于明确诊断的检查不包括

A. 胸水细胞学及生化

B. 胸部CT

C. 胸膜活检

D. 支气管镜

E. 肺功能

56. 女，24岁。近2个月来四肢关节疼痛，伴皮肤结节、红斑。10天前发热（T38℃；）、咳嗽，咳少量痰，胸部X线片示右上肺斑片状影伴空洞形成。该患者最可能的诊断是

A. 支气管肺癌

B. 细菌性肺炎

C. 肺囊肿继发感染

D. 肺脓肿

E. 肺结核

57. 男，68岁。反复咳嗽、咳痰20年，气短10年喘息加重2天。吸烟30年，每日约1包。查体：神志清楚，呼吸急促，端坐位，口唇发绀。桶状胸，左下肺呼吸音明显减弱，右肺可闻及哮鸣音和湿啰音。WBC $6.3 \times 10^9/L$, NO. 85。为进一步诊治，首选的检查是

A. 肺功能

B. 血气分析

C. 痰培养

D. 心电图

E. 胸部X线片

58. 男，69岁。反复咳嗽、咳痰、喘息20年，加重2周，嗜睡1周。无发热、咯血。既往吸烟30年，每日约1包。查体：T36.8℃, BP160/95mmHg, 昏睡状，口唇发绀，颈静脉充盈，肝颈静脉回流征阳性，双肺可闻及哮鸣音和细湿啰音，心率130次/分，P₂>A₂，双下肢水肿，病理征（-）。该患者肺动脉高压形成的最主要机制是

A. 缺氧、CO₂潴留致血管收缩

B. 原位血栓形成

C. 肺毛细血管静水压升高

D. 肺小动脉结构重塑

E. 血红蛋白浓度升高

59. 女，32岁。反复胸痛半年，进行性活动后呼吸困难2个月，否认慢性咳嗽、咳痰及心脏病史。查体：BP120/80mmHg，双肺呼吸音低，未闻及干湿啰音，P₂>A₂，三尖瓣区可闻及3/6级收缩期杂音，剑突下可见心脏搏动。右下肢水肿。为确定诊断最有意义的检查是

A. CT肺动脉造影

B. 胸部X线片

C. 肺通气功能

D. 血气分析

E. 超声心动图

60. 男，68岁。活动后心悸、气短4年。突发喘憋1小时来诊。高血压病史10年余，平时血压波动于(130~150)/(70~90)mmHg，查体：BP230/100mmHg，端坐位，双肺底可闻及少许湿性啰音，心率114次/分。该患者最适宜的治疗是

A. 口服阿替洛尔

B. 口服硝苯地平

C. 口服哌唑嗪

D. 肌内注射利血平

E. 静脉滴注硝普钠

61. 女，34岁。胸闷、气促1月余，伴干咳。查体：R22次/分，BP90/80mmHg。端坐位，颈静脉怒张，双肺未闻及干湿啰音，心率90次/分，律齐，心音低而遥远，P₂无亢进，肝肋下3cm，肝颈静脉回流征阳性，双下肢水肿。其心浊音界最可能为

A. 鞍形

B. 梨形

C. 烧瓶样

D. 向左扩大

E. 普大心

62. 男，72岁。10年前因急性心肌梗死住院。5年前出现活动后气喘，夜间憋醒。近1年双下肢水肿。少尿。查体：BP140/90mmHg，颈静脉怒张。双下肺可闻及细湿啰音。心界向两侧扩大，心率110次/分，肝肋下3cm，质中，压痛（+），双下肢水肿，该患者最可能的诊断为

A. 右心衰竭

B. 全心衰竭

C. 心功能III级（NYHA分级）

D. 左心衰竭

E. 心功能III级（Killip分级）

63. 女，76岁。持续性心房颤动2年，有脑血栓和糖尿病病史，查体：BP120/65mmHg，心率87次/分，心脏各瓣膜区未闻及杂音，该患者最适宜的抗栓治疗措施是

A. 皮下注射低分子肝素

B. 静脉滴注肝素

C. 口服阿司匹林

D. 口服氯吡格雷

E. 口服华法林

64. 男，56岁。2年来间断出现活动时胸闷，休息后可缓解，近4个月无胸闷发作，查体：

BP130/80mmHg，心率73次/分，心脏各瓣膜区未闻及杂音，最有助于明确诊断的检查是

A. 放射性核素静态心肌显像

B. 动态心电图

C. 超声心动图

D. 心电图运动负荷试验

E. 胸部X线片

65. 女，43岁。诊断风湿性心脏病20余年。查体：心前区未触及震颤，胸骨左缘第3肋间可闻及舒张期叹气样杂音，心尖部可闻及舒张早中期杂音，S₁减弱。最可能的诊断是

A. 主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣器质性狭窄

B. 主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣相对性狭窄

C. 主动脉瓣器质性狭窄伴二尖瓣器质性狭窄

D. 主动脉瓣相对性狭窄伴二尖瓣相对性狭窄

E. 主动脉瓣相对性狭窄伴二尖瓣器质性狭窄

66. 男，49岁。发作劳力性胸痛2月余，每次持续5~10分钟，休息2~3分钟可自行缓解。

查体：BP140/90mmHg，心率110次/分，律齐。心电图示窦性心律。为控制心率宜首选的药物

是

- A. 地高辛
- B. 胺碘酮
- C. 普罗帕酮
- D. 维拉帕米
- E. 美托洛尔

67. 男，55岁，突发持续胸痛4小时。查体：BP110/50mmHg，心率30次/分，律齐，心电图示急性下壁、右室心肌梗死，三度房室传导阻滞。为提高心室率应立即采取的治疗措施是

- A. 静脉滴注异丙肾上腺素
- B. 静脉滴注多巴酚丁胺
- C. 静脉注射肾上腺
- D. 同步直流电复律
- E. 植入临时性心脏起搏器

68. 女，68岁。1年前于坐位早餐时无明显诱因突感心悸，随之意识丧失跌倒，数分钟后意识恢复。无大汗、肢体抽搐、口吐白沫和大小便失禁。1年来反复发作上述症状3次。发作与体位和运动无关。查体：BP130/70mmHg，心率48次/分。心电图示二度II型房室传导阻滞。该患者意识丧失最可能的原因是

- A. 低血糖
- B. 心律失常
- C. 癫痫发作
- D. 体位性低血压
- E. 迷走神经张力增高

69. 男，60岁，突发意识丧失，心电监护示心电波形、振幅与频率均不规则，无法辨认QRS波群、ST段与T波。该患者应首选

- A. 利多卡因 $1\sim1.5\text{mg/kg}$ 静脉注射
- B. 美托洛尔5mg静脉注射
- C. 胺碘酮150mg静脉注射
- D. 阿托品0.1mg静脉注射
- E. 360J直流电除颤

70. 男，19岁。约2周前曾咳嗽，流涕，近3天感心悸。查体：心界不大， $P_2>A_2$ ，心率96次/分，可闻及频发期前收缩。心脏各瓣膜区未闻及杂音和附加音。心电图示，室性期前收缩，血清肌钙蛋白升高。该患者最可能的诊断是

- A. 感染性心内膜炎
- B. 扩张型心肌病
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性心包炎
- E. 病毒性心肌炎

71. 男，35岁。发现高血压7个月，未服药，改善生活行为后血压为 $(140\sim150)/(90\sim95)\text{mmHg}$ ，心率56次/分。该患者治疗首选的药物是

- A. 维拉帕米
- B. 哌唑嗪
- C. 利血平
- D. 培哚普利
- E. 比索洛尔

72. 女，40岁。因持续胸痛1天就诊。10天前曾发热伴咳嗽。查体：BP120/70mmHg，心界不大，心率84次/分，律齐，胸骨左缘第3、4肋间可闻及性质粗糙、高音调、与心搏一致的双期搔抓样音，与呼吸无关。该患者最可能的诊断是

- A. 限制型心肌病
- B. 病毒性心肌炎
- C. 急性心包炎
- D. 肥厚型心肌病
- E. 急性胸膜炎

73. 男，38岁。1年来活动后气促，伴腹胀及双下肢水肿。自述既往无不适，生活工作正常。查体：BP100/60mmHg，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿性啰音，心界向两侧扩大，S₁减弱，心尖部可闻及3/6级收缩期杂音，肋下3cm，双下肢凹陷性水肿。该患者最可能的诊断是

- A. 扩张性心肌病
- B. 风湿性心脏病
- C. 缩窄性心包炎
- D. 冠心病
- E. 肥厚型心肌病

74. 男，75岁，进行性吞咽困难3月余，目前能进半流食。胃镜检查：食管距门齿20cm处发现一长约6cm菜花样肿物，病理报告为鳞状细胞癌。其最佳治疗方法为

- A. 食管癌根治术
- B. 姑息食管癌切除术
- C. 化疗
- D. 胃造瘘术
- E. 放疗

75. 女，70岁。蛋白尿1个月，尿蛋白6g/L。蛋白电泳显示以小分子蛋白为主，呈单峰。其蛋白尿的性质应该为

- A. 组织性蛋白尿
- B. 溢出性蛋白尿
- C. 肾小管性蛋白尿
- D. 分泌性蛋白尿
- E. 肾小球性蛋白尿

76. 男，60岁，发现全程肉眼血尿条状血凝块1周。无尿频、尿急、尿痛。B超检查显示左肾实质占位，肿块直径55mm，为明确肿块性质，进一步检查首选

- A. 尿细胞学检查
- B. 肾动脉造影
- C. 静脉尿路造影
- D. 腹部CT平扫+增强
- E. 尿路平片

77. 女，25岁，妊娠7个月，发热，腰痛伴恶心、呕吐、尿频、尿急、尿痛1天。查体：T38.5°C，左肾区叩击痛阳性。血常规：WBC11.9×10⁹/L，N0.82。尿常规：RBC5~8个/HP，WBC30~35个/HP。尿蛋白（+）。最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性肾盂肾炎

E. 急性胃肠炎

78. 女, 25岁。乏力3个月。查体: BP70/105mmHg。化验检查: Hb84g/L, 尿常规: 蛋白(++) , 颗粒管型2~3个/低倍视野, 血BUN12.3mmol/L, Scr276.8μmol/L。针对该患者不应采取的措施是

- A. 低磷饮食
- B. 控制血压
- C. 根据尿量适当限水
- D. 高蛋白饮食
- E. 低钠饮食

79. 男, 65岁。右侧阴囊逐渐增大5年, 无疼痛。查体见右侧阴囊肿大, 大小约15cm×10cm, 呈囊性, 未触及睾丸, 透光试验阳性, 首先应考虑的诊断是

- A. 睾丸炎
- B. 精索静脉曲张.
- C. 腹股沟斜疝
- D. 睾丸肿瘤
- E. 睾丸鞘膜积液

80. 男, 47岁, 水肿6个月。查体: BP120/70mmHg。尿蛋白定量2.5g/d, 尿红细胞20~30个/HP, 血白蛋白32g/L, 血肌酐141μmol/L。临床诊断为

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 急进性肾小球肾炎
- D. 无症状性蛋白尿和(或)血尿
- E. 肾病综合征

81. 男, 35岁。镜下血尿伴蛋白尿3年, 辅助检查: 尿RBC20~25个/HP, 为异形红细胞, 尿蛋白定量1.5g/d, 血肌酐90μmol/L, B超示双肾大小正常。为明确诊断需要进一步采取的检查是

- A. 肾活检 .
- B. 尿培养.
- C. 肾盂造影
- D. ANCA
- E. 腹部X线平片

82. 男, 20岁。跨栏比赛时会阴部受伤。伤后会阴部疼痛、青紫, 尿道出血, 不能自行排尿。应考虑的诊断是

- A. 尿道球部损伤
- B. 耻骨骨折
- C. 后尿道损伤.
- D. 睾丸损伤
- E. 膀胱破裂

83. 女, 35岁。闭经2年, 体检发现双侧乳房触有溢乳, 首选检测的指标是

- A. PRL
- B. FSH
- C. ACTH
- D. GH
- E. TSH

84. 女，64岁，2型糖尿病10年，口服降糖药治疗，近2个月出现头昏，视物模糊。查体：BP170/100mmHg，双肺呼吸音清晰，心界不大，肝脾未触及。双下肢水肿。空腹血糖9.6mmol/L，餐后血糖14.2mmol/L，血肌酐96 μ mol/L，尿蛋白定量0.7g/d，目前应诊断为糖尿病肾病

- A. IV期
- B. V期
- C. II期
- D. III期
- E. I期

85. 女，40岁，闭经、溢乳半年，磁共振发现垂体1.5cmx1.0cm占位病变，需做激素检查。

下列无助于诊断的检查是

- A. 泌乳素
- B. 生长激素
- C. 促肾上腺皮质激素
- D. 血管加压素
- E. 促甲状腺激素

86. 男，45岁。进行性少尿4天。既往体健，查体：BP160/90mmHg，心率120次/分，双下肢水肿，血BUN18.9mmol/L，Scr655.6 μ mol/L。动脉血气分析：pH7.31，PaO₂65mmHg，PaCO₂33mmHg，BE-8.5mmol/L。急需采取的最主要治疗措施是

- A. 透析治疗
- B. 利尿治疗
- C. 降压治疗
- D. 口服泼尼松
- E. 纠正酸毒

87. 男，46岁。消瘦、乏力、头晕、食欲减退3年，近5个月早晨有时出现精神症状。进食后缓解。查体：BP80/60mmHg，皮肤色素沉着，心率60次/分，血糖2.7mmol/L，血纳124mmol/L，血钾5.2mmol/L。最可能的病因是

- A. 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症
- B. 胰岛素瘤
- C. 营养不良
- D. 2型糖尿病
- E. 自主神经功能紊乱

88. 男，30岁。发作性头昏、头痛，伴面色苍白、心悸、冷汗9个月。每次持续20分钟左右，发作时BP(180~220)/(110~140)mmHg，平素血压正常，查体：BP120/80mmHg，体型偏瘦，心率90次/分，律齐，四肢末梢凉对明确诊断最有帮助的是在发作时检测

- A. 血皮质醇
- B. 血醛固酮
- C. 血儿茶酚胺
- D. 血电解质
- E. 血浆肾素活性

89. 女，68岁。高血压病史5年，药物治疗后血压波动于(140~170)/(50~80)mmHg。既往糖尿病史。该患者的收缩压控制目标应低于

- A. 140mmHg
- B. 130mmHg
- C. 125mmHg

-
- D. 120mmHg
E. 110mmHg
90. 女, 50岁。糖尿病肾病伴高血压, BP170/100mmHg, 心率54次/分, 血肌酐 $158 \mu\text{mol/L}$ 。最适宜的治疗药物组合是
- A. 氢氯噻嗪、吲达帕胺
 - B. 氨氯地平、缬沙坦
 - C. 美托洛尔、维拉帕米
 - D. 普萘洛尔、卡托普利
 - E. 螺内酯、福辛普利
91. 女, 32岁。购物时感头晕、恶心、乏力, 随即意识丧失, 摔倒在地, 约1分钟自行苏醒, 无大小便失禁, 无遗留意识或肢体功能障碍。其意识丧失最可能的病因为
- A. 分离(转换)障碍
 - B. 低血糖症
 - C. 迷走神经张力异常增高
 - D. 短暂性脑缺血发作
 - E. 心律失常
92. 女, 21岁。左胫骨下段横形骨折, 经手法复位石膏固定后复查X线片, 符合功能复位的是
- A. 断端旋转 5°
 - B. 断端重叠2cm
 - C. 骨折向外侧成角 5°
 - D. 断端分离1cm
 - E. 骨折向前方成角 5°
93. 男, 41岁。2周前搬重物时出现腰部疼痛, 排便时加重, 并向左下肢放射, 逐渐出现左小腿皮肤感觉减退。查体: 腰部活动受限, 左侧直腿抬高 40° 出现左下肢放射性疼痛, 腰椎X线片未见异常。最可能的诊断是
- A. 腰椎间盘突出症
 - B. 腰椎肿瘤
 - C. 腰椎管狭窄症
 - D. 强直性脊柱炎
 - E. 腰扭伤
94. 女, 65岁, 摔伤致右髋关节疼痛、功能障碍。X线片示右股骨颈头下骨皮质连续性中断。Pauwels角 60° 。该股骨颈骨折属于
- A. 不完全骨折
 - B. 关节外骨折
 - C. 外展骨折
 - D. 稳定性骨折
 - E. 内收骨折
95. 女, 78岁。跌倒时左肩部着地受伤。既往脑梗死病史8年, 遗留左侧肢体偏瘫。查体: 左肩部肿痛, 活动受限。X线片检查示左肱骨大结节与肱骨干交界处可见多个骨碎块, 对线尚可, 略有侧方移位。首选治疗方法是
- A. 尺骨鹰嘴外展位骨牵引
 - B. 手法复位、外固定
 - C. 小夹板固定、皮牵引

D. 切开复位内固定

E. 三角巾悬吊、对症治疗

96. 女，38岁。低热2个月，左大腿根部肿物10天。查体：左腹股沟处可触及5cmx5cm质软圆形肿物，轻度压痛。B超显示为低回声肿物。腰椎X线片上见腰大肌阴影增宽，L₂、L₃椎体边缘骨质破坏，L₂₋₃椎间隙狭窄。首选应考虑的诊断是

A. 转移性骨肿瘤

B. 类风湿关节炎

C. 骨髓炎

D. 骨结核

E. 骨巨细胞瘤

97. 女，45岁。不慎被汽车撞伤左下肢。查体：左膝部及小腿瘀血、肿胀、疼痛，膝关节屈伸受限，足背动脉触诊不清，足背屈、外翻功能障碍。其中符合腓总神经损伤的表现是

A. 小腿疼痛、活动受限

B. 足背屈、外翻功能障碍

C. 小腿瘀血、肿胀

D. 足背动脉触诊不清

E. 膝关节屈伸受限

98. 女，78岁。跌倒右髋受伤2小时，局部疼痛，活动受限，患肢缩短，轴向叩击痛(+)。

X线片显示右股骨颈基底部骨皮质连续性中断，断端嵌插，Pauwels角25°。一般状态差，既往高血压，肺源性心脏病、糖尿病病史30余年，心功能IV级。最佳治疗方案是

A. 闭合复位内固定

B. 切开复位内固定

C. 下肢中立位皮牵引6~8周

D. 转子间截骨矫正力线

E. 人工关节置换术

99. 女，3岁。被牵拉前臂后，出现肘部疼痛。不愿用手取物，桡骨近端压痛。X线片检查未见骨折征象。最适宜的治疗方法是

A. 肩肘固定带悬吊

B. 外敷药物

C. 石膏固定

D. 手法复位

E. 切开探查

100. 男，35岁，机器碾压致腕部、手部受伤，手掌部皮肤严重缺损，肌腱外露，手指均不能屈曲，感觉消失，X线示：2~3掌骨骨折。不正确的处理是

A. 在止血带下清创

B. 行皮瓣移植术

C. 肌腱、神经损伤必须同时行一期修复

D. 影响血供的血管损伤应立即修复

E. 骨折必须复位固定

101. 男，38岁。因车祸致骨盆、股骨骨折急诊手术。术后1天逐渐出现憋气，烦躁不安，经皮血氧饱和度(SPO₂)监测示：由98%逐渐下降至87%，经面罩给氧(5L/min)后SpO₂增加至89%，但症状缓解不明显。查体：T37.2°C，P103次/分，R32次/分，BP90/60mmHg，意识清楚，口唇发绀，双肺呼吸音对称，双肺闻及少许湿啰音，该患者最可能的诊断是

-
- A. 气胸
 - B. 肺血栓栓塞
 - C. 腹腔内出血
 - D. 急性左心衰竭
 - E. 急性呼吸窘迫综合征

102. 男，20岁，高空坠落，下腹部疼痛。骨盆分离和挤压试验阳性，会阴部淤血。首先应考虑的诊断是

- A. 髋关节脱位
- B. 尾骨骨折
- C. 耻骨骨折
- D. 骶骨骨折
- E. 腰椎骨折

103. 男，21岁。车祸致左髋关节受伤，出现左髋部疼痛、外展、外旋、屈曲畸形，弹性固定，正确的诊断是

- A. 股骨颈骨折
- B. 髋关节后脱位
- C. 骨盆骨折
- D. 髋关节中心性脱位
- E. 髋关节前脱位

【A3/A4型题】答题说明：以下提供若干个病例，每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

(104~105题共用题干)

男，70岁，间断咳嗽30余年，加重伴意识障碍2天入院。查体：T38.0℃，P102次/分，R21次/分，BP120/80mmHg，烦躁不安，球结膜充血水肿，口唇发绀。桶状胸，双肺可闻及哮鸣音，双下肺少量湿性啰音。

104. 对诊断最有意义的检查是

- A. 心电图
- B. 脑电图
- C. 痰细菌培养
- D. 动脉血气分析
- E. 胸部CT

105. 该患者禁忌使用的药物是

- A. 甲泼尼龙
- B. 地西泮
- C. 氨茶碱
- D. 地塞米松
- E. 头孢曲松

(106~107题共用题干)

女，48岁，胸闷不适半年，近来出现进行性四肢无力。胸部X线片发现右前上纵隔阴影。

106. 该患者首先考虑的诊断是

- A. 食管囊肿
- B. 胸腺瘤
- C. 神经源性肿瘤
- D. 胸内甲状腺

E. 支气管囊肿

107. 该患者首选的治疗措施是

A. 介入治疗

B. 射频治疗

C. 化疗

D. 放疗

E. 手术治疗

(108~109题共用题干)

男，45岁。发热、咳脓痰1周，胸部X线片示右下叶背段浸润阴影。用头孢呋辛治疗体温稍下降，但痰量增多，为脓血痰，有臭味。1周后复查胸部X线片示：大片浸润阴影中出现空洞。

108. 治疗中需加用的药物是

A. 阿米卡星

B. 左氧氟沙星

C. 甲硝唑

D. 红霉素

E. 万古霉素

109. 治疗2周后，患者临床症状明显改善，胸部X线片示空洞缩小。抗感染的总疗程应为

A. 8~12周

B. 6~8周

C. 3~6周

D. 2~4周

E. 7~10周

(110~111题共用题干)

男，72岁。4小时前因情绪激动突发极度气急，咳嗽，咳粉红色泡沫痰。出冷汗，焦虑不安。既往COPD史20年，高血压病25年。查体：T36.2°C，P120次/分，R34次/分，BP220/130mmHg，神志模糊，端坐位，口唇发绀。无颈静脉怒张。双肺可闻及细湿啰音及哮鸣音。心率120次/分，律齐，心尖区可闻及舒张早期奔马律及2/6级收缩期杂音，腹软，双下肢无水肿。

血气分析：pH7.28, PaO₂60mmHg, PaCO₂60mmHg

110. 该患者突发气急的最可能原因是

A. 肺动脉栓塞

B. COPD合并右心衰竭

C. 高血压合并肺部感染

D. COPD急性加重

E. 高血压合并急性左心衰竭

111. 该患者不适宜的抢救措施是

A. 静脉滴注氨茶碱

B. 静脉注射呋塞米

C. 静脉注射吗啡

D. 静脉滴注硝普钠

E. 静脉注射毛花苷丙

(112~114题共用题干)

女，70岁。突发胸闷、喘憋10小时入院。既往高血压病史12年，糖尿病史5年。查体：

BP160/90mmHg, 端坐呼吸。双肺可闻及广泛湿啰音及散在哮鸣音。心率128次/分，心律齐，心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。ECG示：V1~V6导联ST段抬高。动脉血气分析：pH7.35, PaO₂71mmHg, PaCO₂40mmHg

112. 该患者目前喘憋最可能的病因是

- A. 肺动脉栓塞
- B. 支气管哮喘
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 急性心肌梗死
- E. 肺部感染

113. 最恰当的药物治疗是

- A. 口服华法林
- B. 静脉滴注糖皮质激素
- C. 静脉推注毛花苷C
- D. 静脉滴注硝酸甘油
- E. 静脉滴注抗生素

114. 患者经治疗后好转。入院5天，患者突发呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫痰，查体：BP150/90mmHg, 心尖部可闻及4/6级收缩期杂音。该患者突发呼吸困难的最可能原因为

- A. 肺栓塞进展为肺梗死
- B. 再次发生肺栓塞
- C. 急性乳头肌功能不全
- D. 哮喘急性发作
- E. 肺部感染加重

(115~116题共用题干)

男，15岁。全身水肿1周。查体：BP120/70mmHg, 腹部移动性浊音阳性。尿蛋白定量6.5g/d, 沉渣RBC0~2/HP。血白蛋白22g/L, 胆固醇8mmol/L, BUN6.5mmol/L, Scr98μmol/L。ASO升高，血补体C30.88g/L(正常值0.8~1.5g/L)。

115. 最可能的临床诊断是

- A. 原发性肾病综合征
- B. 狼疮性肾炎
- C. 急进性肾小球肾炎
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 慢性肾小球肾炎

116. 最可能的肾脏病理类型是

- A. 新月体型肾炎
- B. 膜性肾病
- C. 微小病变肾病
- D. 重度系膜增生性肾炎
- E. 系膜毛细血管性肾炎

(117~119题共用题干)

男，40岁。双下肢水肿1个月。查体：BP150/100mmHg, 尿红细胞3~5/HP, 尿蛋白5g/d, 血白蛋白20g/L, 血肌酐70μmol/L。近3天腰痛，尿量减少。复查尿常规：尿红细胞30~50/HP。B超示右肾增大。

117. 血尿加重最可能的原因是

-
- A. 急性过敏性间质肾炎
 - B. 肾静脉血栓形成
 - C. 合并泌尿系统肿瘤
 - D. 进展为新月体肾炎
 - E. 尿路感染

118. 为明确诊断，最重要的检查是

- A. 肾血管彩超检查
- B. 肾活检
- C. 测尿钠排泄分数及尿渗透压
- D. 尿培养
- E. ANCA 及抗 GBM 抗体检查

119. 该患者首选的降血压药物是'

- A. 氨氯地平
- B. 美托洛尔
- C. 哌唑嗪
- D. 氢氯噻嗪
- E. 氯沙坦

(120~121 题共用题干)

男，38岁。会阴部不适，双侧睾丸疼痛1年。社区医院按“前列腺炎”治疗效果不明显，近期症状加重，出现血精。查体：睾丸正常，左侧附睾尾部肿大，质地偏硬，左输精管增粗，呈“串珠状”改变。直肠指检：前列腺略大，有大小不等的结节，无压痛。

120. 最可能的诊断是

- A. 前列腺癌
- B. 附睾、输精管炎'
- C. 精囊炎
- D. 慢性前列腺炎
- E. 生殖系结核

121. 为协助诊断，需补充的最重要的病史是

- A. 不洁性生活史
- B. 泌尿系感染史
- C. 附睾炎病史
- D. 睾丸炎病史
- E. 结核病史

(122~123 题共用题干)

男，70岁。进行性排尿困难10年，夜尿3~4次。从未药物治疗。直肠指检：前列腺体积增大，中央沟消失，表面尚光滑，质地中等。B超：双肾无积水，输尿管未见扩张。最大尿流率10ml/s。

122. 首先考虑的疾病是

- A. 膀胱结石
- B. 膀胱颈部挛缩
- C. 前列腺癌
- D. 前列腺增生
- E. 神经源性膀胱

123. 首选的治疗方法是



-
- A. 膀胱造瘘
 - B. 根治性前列腺切除术
 - C. 口服多沙唑嗪+非那雄胺
 - D. 经尿道前列腺切除术（TURP）
 - E. 膀胱切开取石

(124~126题共用题干)

女，45岁，脸圆、变红1年，体重增加、月经稀发6个月。查体：BP160/100mmHg，向心性肥胖，皮肤薄，面部痤疮较多，下颌小胡须，全身毳毛增多。腹部、大腿根部可见宽大紫纹。血钾1.1mmol/L，空腹血糖15.4mmol/L。

124. 该患者最可能的诊断是

- A. 原发性醛固酮增多症
- B. 原发性高血压
- C. 女性男性化
- D. 库欣综合征
- E. 糖尿病

125. 定性诊断最主要的检查是

- A. 大剂量地塞米松试验
- B. 血ACTH测定
- C. 小剂量地塞米松试验
- D. 血皮质醇测定
- E. 血醛固酮测定

126. 有助于了解其病因或病变部位的检查是

- A. 大剂量地塞米松试验
- B. OGTT
- C. 小剂量地塞米松试验
- D. 血皮质醇测定
- E. 血醛固酮测定

(127~129题共用题干)

男，45岁。体检发现血糖升高，空腹血糖7.6mmol/L，餐后2小时血糖13.6mmol/L，HbA1c7.8%。查体：BP150/100mmHg，BMI28，心、肺、腹查体未见明显异常。.

127. 该患者HbA1c控制目标应小于

- A. 7.5%
- B. 6.5%
- C. 5.5%
- D. 6.0%
- E. 8.0%

128. 在控制饮食和运动基础上首选的降血糖药物是

- A. 二甲双胍
- B. 阿卡波糖
- C. 那格列奈
- D. 吡格列酮
- E. 格列苯脲

(129~131题共用题干)

男，12岁，1个月前无明显诱因出现左胫骨近端肿痛，逐渐加重，皮肤表面静脉怒张，皮温



增高。X线片见左胫骨近端呈溶骨性破坏，、伴有骨膜日光放射表现。

129. 确诊该病的检查方法是

- A. CT
- B. MRI
- C. 组织活检
- D. B超
- E. 核素扫描

130. 最可能的诊断是

- A. 骨囊肿
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨髓炎
- D. 骨肉瘤
- E. 骨结核

131. 最适宜的治疗方法是

- A. 刮除植骨
- B. 对症治疗
- C. 单纯截肢术
- D. 放疗
- E. 化疗+保肢治疗

【B型题】答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(132~133题共用备选答案)

- A. 肺炎克雷伯杆菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 流感嗜血杆菌

132. 上述病原体中，最常见于社区获得性肺炎的是

133. 上述病原体中，血浆凝固酶(+)的是

(134~135题共用备选答案)

- A. 螺内酯
- B. 氨氯地平
- C. 氢氯噻嗪
- D. 维拉帕米缓释剂
- E. 美托洛尔

134. 高血压伴支气管哮喘患者禁用

135. 高血压伴高钾血症禁用

(136~137题共用备选答案)

- A. 胸部X线片
- B. 心肌核磁显影
- C. 冠状动脉CT造影
- D. 心电图

E. 超声心动图

136. 女, 65岁, 心尖部可闻及3/6级收缩期杂音, 最有助于明确诊断的检查是

137. 男, 55岁, 突发胸痛伴大汗3小时, 有吸烟史, 首选的检查是

(138~139题共用备选答案)

A. 上皮细胞管型

B. 白细胞管型

C. 颗粒管型

D. 红细胞管型

E. 脂肪管型

138. 对急性肾盂肾炎诊断有意义的尿常规检查是

139. 对急性肾小球肾炎诊断有意义的尿常规检查是

(140~141题共用备选答案)

A. 草酸盐结石

B. 尿酸结石

C. 混合型结石

D. 碳酸盐结石

E. 磷酸盐结石

140. 腹部平片不显影的结石是

141. 感染性结石的性质是

(142~143题共用备选答案)

A. 皮质醇

B. 泌乳素

C. 肾上腺素

D. 血管加压素

E. 促甲状腺激素释放激素

142. 腺垂体分泌的激素是

143. 神经垂体储存的激素是

(144~145题共用备选答案)

A. 椎动脉型颈椎病

B. 脊髓型颈椎病

C. 交感神经型颈椎病

D. 神经根型颈椎病

E. 复合型颈椎病

144. 手指麻木伴上肢放射痛, 压头试验阳性, 最可能的颈椎病类型是

145. 手足无力、括约肌功能障碍、脚踩棉花感, 最可能的颈椎病类型是

(146~147题共用备选答案)

A. 饮食管理

B. 双胍类

C. 磺脲类

D. 磺脲类+双胍类

E. 胰岛素

146. 女, 45岁, 体重75kg, 身高169cm, 2个月来发现糖尿病; 胃纳食欲良好, 经饮食管理及体育锻炼未能使增高血糖下降, 需加用药物, 首选为



147. 女，25岁，妊娠4个月。经葡萄糖耐量试验证实为糖尿病，空腹血糖10mmol/L。其最恰当的治疗应选择为

(148-150题共用备选答案)

- A. 上腹刀割样痛伴肌紧张
- B. 上腹烧灼痛伴反酸
- C. 上腹钻顶样痛
- D. 右上腹绞痛
- E. 中上腹持续性剧痛

148. 十二指肠球部溃疡的表现是

149. 胆道蛔虫的表现是

150. 内脏穿孔的表现是



第三单元

【A1型题】答题说明：每一道考试题下面有 A、B.、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 发生应激性溃疡最常见的部位是
 - A. 十二指肠降部
 - B. 食管
 - C. 口腔
 - D. 空肠
 - E. 胃
2. 判断乳腺包块周围血供情况首选的检查方法是
 - A. 乳腺 MRI
 - B. 乳腺 B 超
 - C. 钼靶 X 线摄片
 - D. PET
 - E. 胸部 CT
3. 孕早期患下列何种疾病，应终止妊娠
 - A. 细菌性阴道炎
 - B. 巨细胞病毒感染
 - C. 沙眼衣原体感染
 - D. 外阴阴道念珠菌感染
 - E. 生殖道尖锐湿疣
4. 对疑有腹腔内空腔脏器破裂的腹部闭合损伤患者，在观察期内处理错误的是
 - A. 使用广谱抗生素
 - B. 注射止痛剂
 - C. 禁饮食
 - D. 胃肠减压
 - E. 补充血容量
5. 霍乱的传播途径不包括
 - A. 空气传播
 - B. 污染的食物
 - C. 苍蝇媒介
 - D. 日常生活接触
 - E. 污染的水
6. 甲状腺功能亢进症患者的手术禁忌证是
 - A. 中度 Graves
 - B. 胸骨后甲状腺肿伴甲状腺功能亢进症
 - C. 高功能腺瘤
 - D. 妊娠早期重度甲状腺功能亢进症
 - E. 青少年患者
7. 关于志贺菌属细菌的描述，不正确的是
 - A. 对抗菌药物不敏感
 - B. 无鞭毛、芽孢及荚膜
 - C. 均能产生内毒素

-
- D. 分为 4 个群
E. 革兰染色阴性
8. 周围血管疾病用测定双侧肢体皮肤温差的方法判断动脉血流减少情况，温度相差至少应大于
- A. 0.5°C
B. 1.5°C
C. 2.5°C
D. 2.0°C
E. 1.0°C
9. 升结肠癌主要临床表现是
- A. 肠梗阻
B. 便秘.
C. 便血
D. 腹痛
E. 贫血
10. 右下腹麦氏点压痛、反跳痛、肌紧张是急性阑尾炎的典型体征，其发生的主要机制是
- A. 炎症致盲肠痉挛
B. 内脏神经反射
C. 炎症致阑尾痉挛
D. 阑尾腔压力增高，
E. 炎症刺激壁层腹膜
11. 脓毒症早期典型的临床表现是
- A. 呼吸困难
B. 休克
C. 少尿
D. 昏迷
E. 寒战、尚热
12. 若对急性心肌梗死患者行其他疾病的择期手术，最早应在心肌梗死后
- A. 6 个月
B. 1 个月-
C. 3 个月
D. 2 个月
E. 2 周
13. 高渗性缺水的患者常见的临床表现是
- A. 兴奋、手足麻木
B. 头晕、视力减退
C. 淡漠、反应迟缓
D. 呆滞、嗜睡
E. 口渴、谵妄
14. 关于掌深部间隙感染的处理原则，错误的是
- A. 切口常选在手背肿胀明显处
B. 抬高患侧上肢
C. 切口不超过手掌远侧横纹
D. 沿掌间隙纵轴切开引流



金英杰医学
JINYINGJI.COM

-
- E. . 早期静脉滴注大剂量青霉素
15. 胃大部切除术后发生残胃癌的最短时间是术后
- A. 1 年
 - B. 5 年
 - C. 10 年
 - D. 20 年
 - E. 15 年
16. 为抑制甲状腺功能亢进症患者甲状腺素的释放，外科手术前最常选择的药物是
- A. 普萘洛尔
 - B. 卡比马唑
 - C. 甲巯咪唑
 - D. 丙硫氧嘧啶
 - E. 碘剂
17. 类风湿关节炎不常累及的关节是
- A. 肘关节
 - B. 近端指间关节
 - C. 远端指间关节
 - D. 腕关节
 - E. 掌指关节
18. 胃大部切除术后 24 小时以内的胃出血，最常见的原因是
- A. 凝血障碍
 - B. 吻合口张力过高
 - C. 术中止血不确切
 - D. 吻合口感染
 - E. 吻合口黏膜脱落坏死
19. 慢性细菌性痢疾迁延型是指病情迁延不愈，病程至少超过
- A. 150 天
 - B. 60 天
 - C. 28 天
 - D. 7 天
 - E. 14 天
20. 休克指数的计算方法是
- A. 收缩压和舒张压之比
 - B. 心率与收缩压之比
 - C. 脉率与舒张压之比
 - D. 脉率与脉压之比
 - E. 脉率与收缩压之比
21. 肝硬化最常见的并发症是
- A. 门静脉血栓形成
 - B. 原发性肝癌
 - C. 肝性脑病
 - D. 上消化道大出血
 - E. 自发性腹膜炎
22. 与狼疮肾损害关系最密切的自身抗体是

-
- A. 抗 dsDNA 抗体
B. 抗 RNP 抗体
C. 抗 SSB 抗体
D. 抗 Sm 抗体
E. 抗 SSA 抗体
23. 可判断有机磷杀虫药中毒的严重程度并指导治疗最有意义的是
A. 血胆碱酯酶活力
B. 血氧分压
C. 心率
D. 瞳孔大小
E. 肺部湿啰音
24. 最易引起嵌顿的腹外疝是
A. 股疝
B. 小儿脐疝
C. 白线疝
D. 切口疝
E. 腹股沟直疝
25. 细菌性肝脓肿最主要的原因是
A. 膈下脓肿蔓延
B. 开放性肝脏损伤
C. 化脓性门静脉炎
D. 脓毒症
E. 胆管结石并感染
26. 下列根除幽门螺杆菌的方案中首选的是
A. 质子泵抑制剂+克拉霉素+铋剂，治疗 2 周
B. H₂受体拮抗剂+阿莫西林+甲硝唑，治疗 1 周
C. 质子泵抑制剂+克拉霉素+铋剂+阿莫西林，治疗 10 天
D. 铋剂+克拉霉素+法莫替丁，治疗 10 天
E. 质子泵抑制剂+克拉霉素+阿莫西林+硫糖铝，治疗 1 个月
27. 腹膜返折以上直肠癌早期淋巴转移的主要途径是
A. 向直肠上动脉旁淋巴结转移
B. 向腹股沟淋巴结转移
C. 向髂内淋巴结转移
D. 向直肠下动脉旁淋巴结转移
E. 向侧方淋巴结转移
28. 流行性乙型脑炎极期的临床表现不包括
A. 呼吸衰竭
B. 惊厥或抽搐
C. 持续高热
D. 意识障碍
E. 肾衰竭
29. 抗胸腺细胞球蛋白（ATG）治疗重型再生障碍性贫血的机制是
A. 刺激造血干细胞增殖
B. 抑制 T 细胞，使造血功能恢复

-
- C. 稳定血管内皮细胞，减少出血
D. 改善骨髓微环境
E. 提高体内 EPO 水平
30. 根除幽门螺杆菌治疗后，不宜选用的复查方法是
A. ^{13}C 或 ^{14}C 尿素呼气试验
B. 血清幽门螺杆菌抗体检查
C. 组织学检查
D. 快速尿素酶试验
E. 幽门螺杆菌培养
31. 胆总管结石梗阻后最典型的临床表现是
A. Whipple 三联征
B. Charcot 三联征
C. Grey-Turner 征
D. Murphy 征阳性
E. Cullen 征
32. 门静脉高压症主要临床表现是
A. 男性乳房发育
B. 肝掌
C. 肝病面容
D. 腹水
E. 蜘蛛痣-
33. 下列切口不宜放置纱条引流的是
A. 腹壁切口感染
B. 脓性指头炎切开
C. 掌中间隙脓肿切开
D. 体表脓肿切开
E. 乳腺癌改良根治术
34. 蛛网膜下腔麻醉术后 12 小时内应采取的体位是
A. 半卧位
B. 俯卧位
C. 头高脚低位
D. 平卧位
E. 侧卧位
35. 铁剂治疗缺铁性贫血有效的最早期指标是
A. 血清铁蛋白增高
B. 血红蛋白升高
C. 骨髓细胞外铁增多
D. 红细胞总数升高
E. 网织红细胞升高
36. 正常成人热量的基本需要量是
A. $20\text{kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
B. $25\text{kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
C. $35\text{kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
D. $15\text{kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
- 

-
- E. 30kcal/(kg•d)
37. 小胃癌的定义是指癌灶直径小于
- A. 2.0cm
 - B. 0.1cm
 - C. 0.5cm
 - D. 1.5cm
 - E. 1cm
38. 用于胃食管反流病诊断性治疗的药物是
- A. 多潘立酮
 - B. 枸橼酸铋钾
 - C. 奥美拉唑
 - D. 铝碳酸镁
 - E. 雷尼替丁
39. 引起流行性脑脊髓膜炎的病原属于
- A. 奈瑟菌属
 - B. 念珠菌属
 - C. 隐球菌属
 - D. 链球菌属
 - E. 葡萄球菌属
40. 原发性肝癌中最常见的首发临床表现是
- A. 肝脏肿大
 - B. 食欲减退
 - C. 恶心、呕吐
 - D. 肝区疼痛
 - E. 体重下降
41. 属于 DNA 病毒的肝炎病毒是
- A. HBV
 - B. HEV
 - C. HDV
 - D. HCV
 - E. HAV
42. 胃大部切除术后患者，发生早期倾倒综合征的最晚时间是餐后
- A. 20 分钟
 - B. 50 分钟
 - C. 40 分钟
 - D. 30 分钟
 - E. 10 分钟
43. 上消化道大出血最常见的病因是
- A. 门静脉高压症
 - B. 胆道出血
 - C. 胃癌
 - D. 胃淋巴瘤
 - E. 消化性溃疡
44. 采用高选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡，主要依据是



-
- A. 溃疡很少恶变
 - B. 能够减少胃酸分泌
 - C. 患者年龄大于 70 岁
 - D. 能防治幽门螺杆菌感染
 - E. 溃疡病灶小

45. 来源于 T 淋巴细胞的淋巴瘤类型是

- A. 边缘区淋巴瘤
- B. Burkitt 淋巴瘤
- C. 间变性大细胞淋巴瘤
- D. 套细胞淋巴瘤
- E. 滤泡性淋巴瘤

46. 消化性溃疡发病机制中最重要的攻击因子是

- A. 胃酸、胃蛋白酶
- B. 胰酶
- C. 胆汁
- D. 精神、心理因素
- E. 食物的理化刺激

47. 与梗阻性化脓性胆管炎实验室检查结果不符合的是

- A. 碱性磷酸酶升高
- B. 尿胆红素阳性
- C. 尿胆原升高
- D. 血清结合胆红素升高
- E. 白细胞计数升高

48. 先天性腹股沟斜疝发生的最主要原因是

- A. 腹横肌发育不全
- B. 腹横筋膜发育不全
- C. 腹外斜肌发育不全
- D. 腹内斜肌发育不全
- E. 腹膜鞘突不闭锁

49. 治疗急性髓细胞白血病普遍采用的标准化疗方案是

- A. VP
- B. DA
- C. CHOP
- D. COPP
- E. MP

【A2 型题】答题说明：每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

50. 男，5岁。上腹痛1周，伴发热、少尿3天。查体：T39.5℃，P110次/分，R22次/分，BP85/50mmHg。表情淡漠，皮肤、巩膜轻度黄染。腹部膨隆，右上腹压痛（+），轻度肌紧张和反跳痛。肠鸣音减弱。实验室检查：Hb110g/L，WBC15.0×10⁹/L，N0.92。血Cr59 μmol/L。此时首要的处理措施是

- A. 剖腹探查
- B. 应用利尿药
- C. 应用强心药



D. 补充血容量

E. 抗生素治疗

51. 男，50岁。右下腹隐痛伴低热、贫血4个月。下消化道X线钡剂造影示回盲部有充盈缺损，升结肠起始部肠腔狭窄。血CEA明显增高。下列手术治疗术式最合理的是

A. 回肠、横结肠吻合术

B. 全结肠切除术

C. 局部切除

D. 右半结肠切除术

E. 回肠造口术

52. 男，49岁。拟行甲状腺癌根治术。既往有2型糖尿病病史10余年，平素糖尿病饮食，长期口服短效降糖药控制血糖。术前正确的处理措施是

A. 提前1天改服长效降糖药物

B. 提前1周换用普通胰岛素

C. 服用降糖药物至手术前一天晚上

D. 提前3天换用普通胰岛素

E. 术中皮下注射胰岛素

53. 男，47岁。反酸、烧心2个月，间断胸痛、咳嗽，无吞咽困难。首先考虑的诊断是

A. 消化性溃疡

B. 胃食管反流病

C. 食管癌

D. 贲门失弛缓症

E. 胸膜炎

54. 女，48岁。乏力、腹胀伴尿黄3周。慢注乙型肝炎5年，肝功能反复异常。查体：重病容，巩膜与皮肤重度黄染，见肝掌及蜘蛛痣，腹水征（+）。实验室检查：ALT200U/L, TBIL370 μmol/L, HBsAg（+）。该患者可能的诊断是

A. 慢性重型肝炎

B. 慢性肝炎急性发作

C. 急性重型肝炎

D. 慢性肝炎

E. 亚急性重型肝炎

55. 男，7岁。便血10天。大便时见粪便表面附有鲜血，有时在大便后有鲜血滴出，无腹痛，大便次数正常，粪便形状正常。首先考虑的诊断是

A. 内痔

B. 直肠脱垂

C. 直肠息肉

D. 肛窦炎

E. 肛裂

56. 男，44岁。乏力、低热、腹泻伴体重下降3个月。近1年有吸毒史。查体：颌下及腋下淋巴结肿大。对明确诊断最有价值的检查是

A. 骨髓培养

B. 血清抗-HIV抗体

C. 粪便培养

D. 淋巴结活检

E. PPD试验

57. 男，35岁。左下腹外伤后24小时。入院时有弥漫性腹膜炎，行剖腹探查术。术中见腹腔内有黄色脓液及粪便，降结肠下段有一0.5cm穿孔，有粪便溢出。最合适的术式是
- A. 穿孔处修补，横结肠造口
 - B. 单纯结肠穿孔修补术
 - C. 降结肠穿孔处切除，端端吻合术
 - D. 左半结肠切除术
 - E. 单纯腹腔引流术
58. 男，25岁。反复腹痛、腹泻、便血10个月。近日加重伴发热，体温39℃，1天前因腹痛肌注阿托品治疗6小时后腹胀明显。查体：70/50mmHg，心率120次/分。最可能出现的情况是
- A. 肠套叠
 - B. 肠穿孔
 - C. 肠梗阻
 - D. 肠出血
 - E. 中毒性巨结肠
59. 女，55岁。因甲状腺功能亢进症行甲状腺次全切除术后1小时，突感呼吸困难。查体面色青紫，颈部肿胀。引起呼吸困难最可能的原因是
- A. 气管塌陷
 - B. 双侧喉返神经损伤
 - C. 切口内出血
 - D. 喉上神经内外支损伤
 - E. 甲状腺危象
60. 男，22岁。咳嗽伴发热3天，给予青霉素静滴抗感染治疗，用药后患者突然出现气急、胸闷、烦躁不安。查体：T38.5℃，P140次/分，R37次/分，BP75/40mmHg，面色苍白，大汗淋漓。两肺可闻及喘鸣音。身体多部位红色皮疹。最可能的原因是
- A. 急性左心衰竭
 - B. 哮喘急性发作
 - C. 敏感性休克
 - D. 急性呼吸窘迫综合征
 - E. 感染性休克
61. 女，43岁。乙肝肝硬化10年，近1周来高热伴乏力，出现鼻出血和皮肤多处瘀斑。为确定患者是否并发DIC，最有价值的实验室检查指标是
- A. 血浆FVIII:C下降
 - B. APTT延长
 - C. 血浆凝血酶原下降
 - D. 血浆纤维蛋白原下降
 - E. PT延长
62. 男，40岁。肝区疼痛3个月，无发热。右肋下触及肝脏，质硬，表面有直径5cm结节，无触痛。既往慢性乙型病毒性肝炎病史10年。为确认诊断最有意义的检查是
- A. 腹部CT
 - B. 穿刺活检
 - C. 选择性肝动脉造影
 - D. 腹部B超
 - E. 腹部MRI.

63. 女，35岁。与家人吵架后服美曲膦酯100ml，30分钟后被急送医院。查体：昏迷状态，呼吸困难，皮肤湿冷，双瞳孔如针尖大小。正确的紧急处理是
- A. 气管插管气道保护后硫酸铜溶液洗胃+导泻
 - B. 直接应用大量生理盐水洗胃+导泻
 - C. 直接应用硫酸铜溶液洗胃+导泻
 - D. 气管插管气道保护后2%碳酸氢钠溶液洗胃
 - E. 气管插管气道保护后应用大量温水洗胃+导泻
64. 女，20岁。头晕、乏力1年。实验室检查：Hb70g/L, RBC3.0×10¹²/L, WBC4.1×10⁹/L, PLT200×10⁹/L, 血清铁蛋白4μg/L。最可能的诊断是
- A. 慢性病性贫血
 - B. 巨幼细胞贫血
 - C. 缺铁性贫血
 - D. 地中海贫血
 - E. 骨髓增生异常综合征
65. 男，21岁。足底被生锈钉刺伤后8天，四肢抽搐2天，发作时头颈部后仰、强直，牙关紧闭，口唇青紫，大汗淋漓。该患者最严重的并发症是
- A. 骨折
 - B. 舌咬伤
 - C. 肺部感染
 - D. 室息
 - E. 脑疝
66. 女，30岁。反复腹痛、腹泻10年。排便后腹痛可缓解，无发热、消瘦。多次查粪常规示软便或黏液便，镜检（-），隐血（-）。最可能的诊断是
- A. 克罗恩病
 - B. 肠结核
 - C. 溃疡性结肠炎
 - D. 慢性细菌性痢疾
 - E. 肠易激综合征
67. 女，60岁。上腹胀痛伴恶心。呕吐2次，右下腹阵痛加剧、腹胀半天。查体：T38.3℃, P120次/分, BP150/90mmHg, 全腹压痛（+），右下腹明显，有肌紧张，肝浊音界存在，未闻及肠鸣音。实验室检查：WBC13.0×10⁹/L, N0.88。右下腹穿刺抽出黄色混浊液体2ml, 镜检脓细胞（++）。最可能的诊断是
- A. 重症急性胰腺炎
 - B. 绞窄性肠梗阻
 - C. 阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
 - D. 消化性溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
 - E. 伤寒肠穿孔并弥漫性腹膜炎
68. 男，55岁。胰头癌行胰十二指肠切除术后6天，发现整个右下肢肿胀。查体：右下肢皮温增高，股三角区深压痛，足背动脉搏动存在。错误的治疗措施是
- A. 应用止血药物
 - B. 口服阿司匹林
 - C. 皮下注射低分子肝素
 - D. 卧床休息、抬高患肢
 - E. 静脉输注低分子古旋糖酐

69. 女，50岁。恶心伴乏力、少尿6小时，呕吐量大，无口渴。2年前有腹部手术史。此时患者最可能出现的水电解质平衡紊乱是

- A. 高渗性缺水
- B. 稀释性低钠血症
- C. 低渗性缺水
- D. 等渗性缺水
- E. 高钾血症

70. 女，52岁。肥胖。右腹股沟韧带下方卵圆窝处可见3cmx3cm半球状突起，局部有胀痛感。平卧时突起可变小、变软，但有时不完全消失。查体：卵圆窝处咳嗽冲击感不明显。最常用的手术方式是

- A. McVay法
- B. Halsted法
- C. Bassini法
- D. Ferguson法
- E. Shouldice法

71. 女，23岁。腹痛、腹泻、里急后重伴发热半天。查体：T39.2°C，BP126/80mmHg，腹软，左下腹压痛(+)，反跳痛(-)。实验室检查：血WBC18×10⁹/L，N0.87，10.13。粪镜检WBC满视野，RBC20个/HP。最可能的诊断是

- A. 急性细菌性痢疾
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性阿米巴痢疾
- D. 霍乱
- E. 急性肠炎

72. 女，18岁。发热、鼻出血3天。查体：全身浅表淋巴结肿大，最大者2.5cmx2cm大小，胸骨压痛(+)，肝脾肋下均可触及边缘。骨髓细胞学检查：骨髓原始细胞占0.65，过氧化物酶(-)，非特异酯酶染色(-)。最可能的诊断是

- A. 急性早幼粒细胞白血病
- B. 急性粒-单核细胞白血病
- C. 急性单核细胞白血病
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 急性红白血病

73. 女，23岁。外阴瘙痒、白带增多5天。有不洁性交史。妇科检查：外阴皮肤黏膜充血，小阴唇内侧见多个小菜花状赘生物，宫颈光滑，子宫正常大，附件无异常。最可能的诊断是

- A. 淋病
- B. 梅毒
- C. 尖锐湿疣
- D. 外阴阴道念菌病
- E. 滴虫阴道炎

74. 男，40岁。术后粘连性肠梗阻3天，加重1天。查体：可见肠蠕动波，肠鸣音亢进，右下腹有局限性压痛。多次立位腹部X线平片可见固定肠袢。正确的治疗措施是

- A. 继续补液、观察病情变化
- B. 注射吗啡止痛
- C. 灌肠治疗
- D. 剖腹探查

E. 出现腹膜刺激征后手术

75. 女, 60岁。乳腺癌根治术后3天, 大便后起立时突感呼吸困难, 随即意识丧失, 呼吸及大动脉搏动消失。立即给予心肺复苏, 呼吸道吸出血性液体。最可能的情况是

- A. 急性心肌梗死
- B. 乳腺癌肺转移
- C. 肺血栓栓塞
- D. 自发性气胸
- E. 心源性休克

76. 男, 33岁。急性坏疽性阑尾炎手术后4天, 出现尿频、尿急、大便次数增多、里急后重、发热。其最可能的并发症是

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 盆腔脓肿
- C. 肛周脓肿
- D. 阑尾残株炎
- E. 急性膀胱炎

77. 男, 32岁。因十二指肠溃疡行 Billroth II式胃大部切除术后6个月。术后出现反酸、烧心症状。应用抑酸剂治疗无效。上述症状逐渐加重, 并呕吐胆汁样物, 上腹部及胸骨后烧灼样疼痛, 体重减轻。查体: 贫血貌, 消瘦, 营养不良, 巩膜无黄染。胃液中无游离酸。胃镜检查见黏膜充血、水肿、糜烂。最适当的治疗措施是

- A. 采用少食多餐方式
- B. 行 Roux-en-Y 胃空肠吻合术
- C. 长期应用考来烯胺治疗
- D. 注意餐后勿平卧
- E. 应用 H₂受体拮抗剂



78. 女, 45岁。1天前进高脂餐后出现右上腹剧烈绞痛, 阵发性加剧, 并向右肩背部放射, 伴恶心、呕吐、发热, 体温38℃。该患者最可能的诊断是

- A. 肝脓肿
- B. 胃溃疡穿孔
- C. 急性肺栓塞
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性胰腺炎

79. 男, 44岁。肝区疼痛2个月。呈持续性钝痛, 放射至右肩背部, 消瘦、乏力。查体: 巩膜无黄染, 肝肋下3cm, 质地稍硬, 有结节感。AFP800 μg/L, B超不肝右叶8cm×6cm占位病变, 向外生长, 周边血流量增强, 门静脉正常。最理想的治疗方法是

- A. 肿瘤切除加放疗
- B. 姑息性肝切除术
- C. 根治性肝切除术
- D. 肝动脉化疗栓塞
- E. 局部射频治疗

80. 男, 68岁。便习惯改变3个月, 便中带血1周, 查体: 浅表淋巴结未触及肿大, 腹平软, 未触及包块, 移动性浊音(-), 肠鸣音正常。直肠指诊: 直肠前壁距肛缘4cm菜花型肿物, 侵及直肠1/4周径, 肿物直径2cm, 指套染血。明确诊断及选择治疗方式, 最佳的辅助检查是

- A. 腹部MRI

B. 腹部 CT

C. 腹部 B 超

D. 直肠镜

E. 结肠镜

81. 男，28岁。右大腿清创缝合术后6天，发热，局部伤口红肿，范围较大，疼痛明显。伤口局部见稀薄脓液，淡红色，量多，无异味。最可能感染的致病菌是

A. 大肠埃希菌

B. 铜绿假单胞菌

C. 溶血性链球菌

D. 金黄色葡萄球菌

E. 无芽孢厌氧菌

82. 男，22岁。下腰痛2年余，加重6周。疼痛以夜间明显。有痛醒现象。查体：双侧“4”字试验阳性，腰部活动受限。实验室检查：血沉48mm/h，HLA-B27阳性。最可能的诊断是

A. 腰椎间盘突出症

B. 类风湿关节炎

C. 风湿性关节炎

D. 强直性脊柱炎

E. 腰肌劳损

83. 男，40岁。恶心、呕吐、尿色变深2天。既往无肝炎病史。查体：巩膜黄染，肝肋下2cm。

实验室检查：ALT800U/L，TBIL60 μmol/L，抗HAVIgM(-)，HBsAg(+)，抗HBs(-)，抗HBcIgM(+)。

该患者最可能的诊断是

A. 急性甲型肝炎

B. 急性肝炎，HBsAg携带者

C. 乙型肝炎恢复期

D. 甲型肝炎恢复期

E. 急性乙型肝炎

84. 女，35岁。腹胀、便秘、乏力6个月。1周来症状加重伴呕吐。查体：T37.6°C；，右腹可触及5cmx3cm大小包块，质中等，边界不清，轻触痛。胸片示右侧胸膜肥厚，右上肺钙化灶。首先考虑的临床诊断是’

A. 右侧卵巢肿瘤 .

B. 肠结核

C. 结肠癌

D. 克罗恩病

E. 阑尾周围脓肿

85. 男，66岁。食用坚果后突发呕血4小时，伴心悸、胸闷、气短。既往慢性乙型肝炎病史20年，冠心病史8年。查体：BP90/50mmHg，心率110次/分，心律不齐，期前收缩10次/分。

最适合的治疗药物是

A. 西咪替丁

B. 硝酸甘油

C. 普萘洛尔

D. 血管加压素

E. 生长抑素

86. 男，18岁。练双杠时撞击上腹部，突发腹痛4小时。疼痛加重，伴背部疼痛、恶心、呕吐，呕吐物中有胃液和胆汁。既往有胆囊炎病史。腹部X线平片检查：横结肠肝曲胀气，腹



膜后有气体征象。粪隐血（-）。最可能的诊断是

- A. 右肾破裂
- B. 肝破裂
- C. 胆囊破裂
- D. 十二指肠破裂
- E. 结肠破裂

87. 男，58岁。进行性吞咽困难2月余，上消化道X线钡餐造影见食管下段黏膜紊乱，部分管壁僵硬。为明确诊断，首选的检查是

- A. 食管拉网
- B. 胸部增强CT
- C. 食管超声
- D. PET-CT
- E. 食管镜

88. 男，58岁。胃部不适伴反酸20年，近1周来腹胀、恶心、呕吐，吐出大量宿食，每天1~2次。查体：呼吸浅，17次/分，血压正常。上腹部可见胃型，轻压痛。测血 K^+ 3.0mmol/L， Na^+ 130mmol/L， Cl^- 90mmol/L， CO_2CP 45mmol/L。该患者的酸碱平衡失调的类型是

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒
- E. 代谢性碱中毒

89. 女，45岁。前额部疖肿10天。多次挤压排脓。今突发寒战、高热，伴头晕，无抽搐。

查体：T40°C，P90次/分，R26次/分，BP100/70mmHg，神志清楚，前额红肿，伴脓头，胸壁及肢体皮下可见瘀斑。血WBC $20.2 \times 10^9/L$ ，核左移。血培养（-）。该患者目前的主要诊断是

- A. 脓毒症
- B. 额部蜂窝织炎
- C. 菌血症
- D. 颅内感染
- E. 感染性休克

90. 男，52岁。皮肤、巩膜黄染2个月。大便颜色变浅，无腹痛及发热。查体：皮肤、巩膜黄染，右上腹触及囊性包块，无压痛。腹部B超示：胆总管扩张，胆囊大，胰腺显示不清。该患者最可能的诊断是

- A. 胆总管结石
- B. 胆囊癌
- C. 慢性胆囊炎
- D. 慢性胰腺炎
- E. 壶腹周围癌

91. 男，34岁。饮啤酒后右膝关节红肿疼痛1天。3个月前左踝关节曾有相似症状发生，服非甾体抗炎药1周后好转。既往银屑病史10年。最可能的诊断是

- A. 痛风关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 银屑病关节炎
- D. 化脓性关节炎
- E. 强直性脊柱炎

92. 女，36岁。上腹痛伴烧心3年，多在餐后约1小时出现剑突下疼痛，1~2小时后可缓解。内科规范治疗1年，症状反复发作，曾有2次黑便。胃镜及X线钡餐透视可在胃角处见1.5cm大小溃疡，决定手术治疗，首选的术式为

- A. 高选择性迷走神经切断术加引流术
- B. BillrothI 胃大部切除术
- C. BillrothII 胃大部切除术
- D. Roux-en-Y 吻合术加迷走神经干切断术
- E. 选择性迷走神经切断术加引流术

93. 男，55岁。上腹部不适2个月。进食后饱胀，有时伴疼痛，食欲下降、乏力，症状逐渐加重。为明确诊断首选的检查是

- A. 胃液分析
- B. 胃镜
- C. 食管24小时pH监测
- D. 腹部X线片
- E. 腹部CT

94. 女，25岁。头晕、乏力2个月。既往体健，近1年来月经量明显增多。实验室检查：Hb95g/L，RBC3.5×10¹²/L，红细胞大小不等，中心淡染区扩大，WBC4.5×10⁹/L，PLT310×10⁹/L，粪隐血（-）。最根本的治疗措施是

- A. 治疗妇科疾病
- B. 给予雄性激素
- C. 给予铁剂
- D. 给予糖皮质激素
- E. 给予维生素B₁₂及叶酸

95. 男，42岁。寒战、发热5天，右季肋部痛2天，疼痛于深呼吸及咳嗽时加重。查体：巩膜轻度黄染，肝肋下2cm，Murphy征阴性，肝区叩击痛阳性。胸部X线片：右侧膈肌抬高，肋脊角消失。肝脏B超：肝右叶可见6cm×5cm低回声区，边界欠清晰，中心有液性暗区。首先考虑的诊断是

- A. 肺炎
- B. 肝脓肿
- C. 肝结核
- D. 结核性胸膜炎
- E. 肝癌

96. 女，60岁。被家人发现其昏迷在浴室内，浴室使用的是燃气热水器。急诊入院。查体：皮肤潮红，瞳孔大小正常，口唇樱桃红色。最可能的诊断是

- A. 阿托品中毒
- B. 一氧化碳中毒
- C. 乙醇中毒
- D. 有机磷杀虫药中毒
- E. 安眠药中毒

97. 女，40岁。皮肤出血点及瘀斑、牙龈出血1周。查体：肝脾不大。血常规：Hb110g/L，WBC4.0×10⁹/L，PLT10×10⁹/L；骨髓细胞学检查：巨核细胞95个/(2cm×2cm)，产板型巨核细胞1个。最可能的诊断是

- A. 急性白血病
- B. 特发性血小板减少性紫癜

C. 再生障碍性贫血

D. 骨髓增生异常综合征

E. 巨幼细胞贫血

98. 女，53岁。腹痛、腹胀、低热4周，表情淡漠、嗜睡1天。腹部B超示：肝实质弥漫性病变、脾大及腹水。对该患者诊断最有意义的阳性体征是

A. 肌张力增高

B. Babinski征阳性

C. 扑翼样震颤阳性 D. 腹壁反射消失

E. 腱反射亢进

99. 男，54岁。呕血、黑便2天，嗜睡、行为改变1天。实验室检查：

ALT35U/L, AST72U/L, ALB27.3g/L。腹部B超示脾大。最可能的诊断是

A. 胃癌

B. 肝硬化失代偿期

C. 急性胃黏膜病变

D. 消化性溃疡

E. 食管贲门黏膜撕裂综合征

100. 男，26岁。因腹部外伤急诊入院，行剖腹探查，见肝右叶8cm长裂口，较深，有不易控制的动脉性出血。术中最有效的止血方法是

A. 全身和局部同时应用止血药物

B. 用纱布或绷带条压迫止血

C. 明胶海绵或氧化纤维填入裂口

D. 填塞大网膜后缝合裂口

E. 阻断肝门血流后止血

101. 男，39岁。行甲状腺癌根治术后1天，感觉面部针刺样麻木，手足抽搐。正确的处理措施是

A. 静脉注射钙剂

B. 伤口切开

C. 口服维生素D₃

D. 气管切开

E. 口服葡萄糖酸钙

102. 女，39岁。因胆结石行胆囊切除术后1天。静息能量消耗(REE)比正常约增加

A. 50%

B. 10%

C. 30%

D. 5%

E. 20%

103. 男，32岁。反复脓血便伴里急后重1年，抗生素治疗无效。下消化道X线钡剂造影检查发现直肠、乙状结肠多发龛影，黏膜紊乱及颗粒样改变。最可能的诊断是

A. 克罗恩病

B. 溃疡性结肠炎

C. 肠结核

D. 细菌性痢疾

E. 结肠癌

104. 男，40岁。呕血2小时急诊就诊。面色苍白，口渴，脉搏快但有力。既往十二指肠溃

疡病史 10 年。在急诊室抢救时，胃镜止血未成功，24 小时输血量达到 1600ml 仍未改善症状。应采取的进一步治疗措施是

- A. 急症剖腹探查
- B. 加用成分输血，
- C. 冰盐水 200ml 加去甲肾上腺素 8ml 洗胃
- D. 双静脉通道晶体、胶体同时输注
- E. 静脉应用止血药

105. 男，28 岁。间断腹痛、发热 3 年。结肠镜检查：回肠末段见 4cm×1cm 纵型溃疡，周围黏膜铺路石样改变。活检标本可能出现的主要病理改变是

- A. 隐窝脓肿
- B. 杯状细胞减少
- C. 非干酪样肉芽肿
- D. 干酪样肉芽肿
- E. 可见包涵体

106. 男，43 岁。肝炎肝硬化病史 15 年，反复少，尿、腹胀 1 年，一周来腹痛伴低热。腹水常规：比重 1.017，蛋白 28g/L，细胞总数 $920 \times 10^6/L$ ，白细胞 $800 \times 10^6/L$ ，多形核细胞 0.80。最可能的诊断是。

- A. 门静脉血栓形成
- B. 结核性腹膜炎
- C. 原发性肝癌
- D. 自发性腹膜炎
- E. 肝肾综合征

【A3/A4 型题】答题说明：以下提供若干个病例，每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(107~109 题共用题干)

女，68 岁。突发上腹阵发性绞痛 2 小时，短时间内寒战、高热，小便呈浓茶样，随后嗜睡。查体：T39.6°C，P128 次/分，R30 次/分，BP80/50mmHg。神志不清，躁动，巩膜黄染，右上腹肌紧张，有压痛和反跳痛。

107. 导致该患者所患疾病最可能的病因是

- A. 胆管肿瘤
- B. 胆管结石
- C. 胆管蛔虫
- D. 胆管狭窄
- E. 胆管畸形

108. 以下非手术治疗措施中，错误的是

- A. 持续吸氧
- B. 联合使用足量抗生素
- C. 纠正水、电解质紊乱
- D. 输注 2 个单位红细胞
- E. 禁食、胃肠减压

109. 急症手术最有效的手术方式是

- A. 胆总管切开减压术
- B. 腹腔镜胆囊切除术

-
- C. 胆囊造瘘术
 - D. 胆总管空肠吻合术
 - E. 胆总管十二指肠吻合术

(110~112 题共用题干)

女，58岁。乏力、低热1个月。查体：双侧颈部、腋窝和腹股沟均可触及肿大淋巴结，最大者直径2cm、质韧、无触痛，胸骨无压痛，肝肋下未触及，脾助下3cm。实验室检查：Hb76g/L，WBC5.2×10⁹/L，PLT123×10⁹/L，网织红细胞0.14，Coombs试验（+），尿胆红素（-），尿胆原（+++）。

- 110. 最可能的诊断是
- A. 急性粒细胞白血病
- B. 淋巴瘤
- C. 淋巴结炎
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 骨髓增生异常综合征

- 111. 为确诊首选的辅助检查是

- A. 腹部B超
- B. 骨髓活检
- C. 骨髓细胞学检查
- D. 胸部X线片
- E. 淋巴结活检

- 112. 针对该患者的贫血首选的治疗药物是

- A. 泼尼松
- B. 促红细胞生成素
- C. 环磷酰胺
- D. 环孢素
- E. 丙种球蛋白

(113~114题共用题干)

男，50岁。颈后肿痛5天，疼痛逐渐加重，伴畏寒、发热。有糖尿病史10年。查体：颈后红肿，范围约5cm，边界不清，中央多个脓点。

- 113. 该患者最可能的诊断是
- A. 皮脂腺囊肿感染
- B. 颈部丹毒
- C. 颈部痈
- D. 颈部疖
- E. 蜂窝织炎

- 114. 若行切开引流术，下列错误的处理措施是

- A. 未化脓但颜色已暗紫的组织也要清除
- B. 可行“++”形切口切开引流
- C. 切口线不宜超过病变边缘
- D. 切口线要深达筋膜
- E. 创面内填塞敷料压迫止血

(115~117题共用题干)



男,45岁。进食高脂餐并饮酒后上腹持续疼痛8小时,呕吐2次后疼痛无缓解。查体:T37.8℃,上腹偏左压痛、反跳痛阳性。

115.最有诊断意义的辅助检查是

- A. 血清脂肪酶
- B. 血常规
- C. 血清淀粉酶
- D. 立位腹部X线平片
- E. 心电图

116.最可能的诊断是

- A. 急性胃炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性心肌梗死

117.如需使用抗生素治疗,抗生素选择的最佳配伍是甲硝唑和

- A. 阿奇霉素
- B. 克林霉素
- C. 环丙沙星
- D. 头孢拉啶
- E. 青霉素

(118~119题共用题干)

男,70岁。饮酒1小时后呕咖啡样物100ml,后排黑便100g。既往体健。查体:P110次/分,BP90/50mmHg。

118.首选的治疗药物是

- A. 多巴胺
- B. 硫糖铝
- C. 氨甲苯酸
- D. 纳洛酮
- E. 奥美拉唑

119.对诊断及治疗最有意义的检查是

- A. 胃镜
- B. 腹部X线平片
- C. 上消化道X线钡餐造影
- D. 腹部B超
- E. 腹部CT

(120~121题共用题干)

男,65岁。大量呕血、黑便1天。既往有胃溃疡病史20年,曾有多次出血史。查体:P126次/分,BP86/50mmHg。神情紧张,烦躁,手足湿冷,腹软,上腹部压痛(+),肠鸣音亢进。血常规:Hb90g/L,血细胞比容0.30。心电图示窦性心动过速。

120.对该患者目前首选的重要治疗措施是

- A. 输注浓缩红细胞
- B. 立即静注止血药
- C. 立即静滴垂体后叶素

D. 冰盐水 200ml+去甲肾上腺素 8mg 胃内灌注

E. 快速静滴平衡盐溶液

121. 经急诊胃镜发现胃角切迹大溃疡，活动出血明显，决定行胃大部切除术，为达到治疗效果，至少应切除胃的

A. 30%左右

B. 50%左右

C. 80%左右

D. 40%左右

E. 60%左右

(122~123 题共用题干)

女，38岁。发热、皮疹、脱发和口腔溃疡6个月。查体：T39.0°C，面部有充血性红斑，双手近端指间关节压痛，轻度肿胀，双下肢凹陷性水肿。实验室检查：尿蛋白(++)，尿红细胞(++)，24小时尿蛋白3.8g，血PLT88×10⁹/L，ANA1:640，抗SSA抗体(+)，抗双链DNA抗体(+)，补体C3低下。

122. 不能提示患者疾病处于活动期的指标是

A. 补体C3低下

B. 尿蛋白(++)

C. 抗双链DNA抗体(+)

D. 血小板减少

E. 抗SSA(+)

123. 最佳治疗方案是泼尼松1mg/(kg·d)联合

A. 布洛芬

B. 血浆置换

C. 环磷酰胺

D. 青霉素

E. 柳氮磺吡啶

(124~125 题共用题干)

男，32岁。右大腿枪弹伤4小时。伤口已经在院外经过初步处理。查体：T37.8°C，P141次/分，R28次/分，BP72/43mmHg。面色苍白，呼吸急促。双肺呼吸音清晰，心律齐。腹软，无压痛。大腿中下1/3处对穿性伤口，已经用纱布覆盖包扎，无明显渗血。足背动脉搏动弱。

124. 该患者首要的处理措施是

A. 拆开纱布，检查伤口

B. 急诊清创缝合

C. 注射TAT

D. 建立静脉通道，补充血容量

E. DSA检查了解有无血管损伤

125. 若对该患者行清创术，以下措施不正确的是

A. 沿大腿纵轴切开探查，切除创缘皮肤1~2mm

B. 若有大血管损伤，尽量修补

C. 伤口内放置引流物

D. 伤口内近端绕扎止血带

E. 若清创彻底，一期缝合伤口

(126~128 题共用题干)

男，68岁。阵发性腹痛1年，自觉有“气块”在腹中窜动，起初大便次数增加，近3个月腹胀、便秘，近3天无肛门排气、排便，呕吐物有粪便臭味，一直感乏力和低热。

126. 根据病史考虑肠梗阻应为

- A. 高位完全梗阻
- B. 低位不完全梗阻
- C. 血运性肠梗阻
- D. 高位不完全梗阻
- E. 低位完全梗阻

127. 该患者引起梗阻的病因最可能的是

- A. 粪块
- B. 炎性狭窄
- C. 肠系膜血栓
- D. 肿瘤
- E. 粘连带

128. 禁忌使用的检查是

- A. 结肠镜
- B. 立位腹部X线平片
- C. 腹部B超
- D. 腹部CT
- E. 全消化道钡餐造影

(129~130题共用题干)

男，40岁。体重60kg，右上肢肩关节以下、右下肢膝关节以下烧伤深度为浅II度至深II度，右足部烧伤深度为III度。

129. 该患者的烧伤总面积为

- A. 20%
- B. 38%
- C. 37%
- D. 19%
- E. 18%

130. 该患者第一个24小时的补液量应为

- A. 2500ml
- B. 1700ml
- C. 2000ml
- D. 3700ml
- E. 4000ml

(131~132题共用题干)

男，38岁。发热伴腹胀、乏力1周。查体：T39℃，P84次/分，表情淡漠，胸部少许充血性皮疹，脾肋下可触及，质软。实验室检查：血WBC3.6×10⁹/L，N0.59，杆状核粒细胞0.01，10.40。

131. 最可能的诊断是

- A. 斑疹伤寒
- B. 结核病
- C. 疟疾

-
- D. 伤寒
 - E. 布鲁菌病
132. 确诊最有价值的检查是
- A. 外斐试验
 - B. PPD 试验
 - C. 血培养
 - D. 布氏杆菌凝集试验
 - E. 血涂片找虐原虫

(133~134 题共用题干)

男。35岁。头痛伴视物模糊3个月，偶伴抽搐，曾在大便中发现带状节片。

133. 最可能的诊断是
- A. 隐球菌性脑膜炎
 - B. 结核性脑膜炎
 - C. 病毒性脑膜炎
 - D. 脑肿瘤
 - E. 脑囊尾蚴病
134. 为明确诊断，最重要的检查是
- A. 头颅X线片
 - B. 腰穿脑脊液检查
 - C. 脑室造影
 - D. 脑电图检查
 - E. 头颅MRI

(135~136 题共用题干)

- 女，35岁。腹胀、腹部隐痛伴低热3个月。突发脐周绞痛6小时，呕吐数次，无排气，排便。
135. 最可能的诊断是
- A. 消化性溃疡伴幽门梗阻
 - B. 慢性阑尾炎急性发作
 - C. 结肠癌并肠穿孔
 - D. 结核性腹膜炎并肠梗阻
 - E. 缺血性肠病并肠梗阻
136. 首选的检查是
- A. 结肠镜检查
 - B. 立位腹部X线平片
 - C. 腹部B超
 - D. 腹部CT
 - E. 腹部MRI

【B型题】答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- (137~138 题共用备选答案)
- A. 灭鼠
 - B. 灭鼠

C. 灭蜱

D. 灭蚤

E. 灭蚊

137. 流行性乙型脑炎的防御措施是

138. 肾综合征出血热的防御措施是

(139~140 题共用备选答案)

A. 丙氨酸氨基转移酶

B. 碱性磷酸酶

C. 谷氨酸氨基转移酶

D. 白蛋白

E. 甲胎蛋白

139. 反射肝硬化肝功能减退的血清指标是

140. 继发性肝癌一般不会发生变化的指标是

(141~142 题共用备选答案)

A. 肛裂

B. 直肠癌

C. 肛瘘

D. 内痔

E. 直肠息肉

141. 肛诊检查触及不规则肿物，质硬、固定，最可能是

142. 肛诊检查触及黏膜外条索状肿物，质地稍硬、固定，最可能是

(143~144 题共用备选答案)

A. 白血病

B. 结肠癌

C. 甲状腺癌

D. 肺癌

E. 乳腺癌

143. 携带缺陷基因 BRCA-1 者易患的疾病是

144. 适用 Dukes 分期的疾病是

(145~146 题共用备选答案)

A. 人乳头瘤病毒

B. 苍白密螺旋体

C. 单纯疱疹病毒

D. 革兰阴性双球菌

E. 构端螺旋体

145. 梅毒的病原体是

146. 尖锐湿疣的病原体是

(147~148 题共用备选答案)

A. Cushing 溃疡

B. 胃溃疡

C. Curling 溃疡

D. 食管腐蚀性溃疡

E. 十二指肠溃疡

147. 最易发生癌变的溃疡是

148. 烧伤患者发生的溃疡是

(149~150 题共用备选答案)

A. 应用全反式维 A 酸

B. 应用干扰素 α

C. 放射治疗

D. 造血干细胞移植

E. 应用羟基脲

149. 急性早幼粒细胞白血病 (M3) 首选的治疗是

150. 使慢性粒细胞白血病达到血液学缓解首选的治疗是



第四单元

【A1型题】答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎增生不明显的是
 - A. 肾小球系膜增生
 - B. 肾小球毛细血管内皮增生
 - C. 肾小球囊壁层上皮增生
 - D. 淋巴细胞增生
 - E. 中性粒细胞增生
2. 医疗机构应当按照规定对使用后的一次性医疗器具予以
 - A. 消毒
 - B. 检测
 - C. 封存
 - D. 登记
 - E. 销毁
3. 病毒性肺炎目前以下列哪种发病率最高
 - A. 腺病毒肺炎
 - B. 呼吸道合胞病毒肺炎
 - C. 巨细胞病毒肺炎
 - D. 流感病毒肺炎
 - E. 柯萨奇病毒肺炎
4. 刊登、播放、散发和张贴医疗器械广告的批准部门是
 - A. 国家药品监督管理部门
 - B. 省级以上人民政府药品监督管理部门
 - C. 地、市级以上人民政府药品监督管理部门
 - D. 地、市级卫生行政部门
 - E. 省级卫生行政部门
5. 不属于突发卫生事件的是
 - A. 重大传染病疫情
 - B. 群体性不明原因疾病
 - C. 个别医疗伤亡
 - D. 重大食物中毒
 - E. 重大职业中毒
6. 高分化鳞癌最重要的镜下特点是
 - A. 细胞条索样坏死
 - B. 角化珠
 - C. 细胞条索
 - D. 细胞巢
 - E. 细胞巢伴有坏死
7. 对于阴道炎的治疗，下列哪项是不恰当的
 - A. 滴虫性阴道炎的治愈标准，是在滴虫转阴后每次月经后复查白带，三次阴性为治愈



-
- B. 念珠菌性阴道炎反复发作应查尿糖、血糖，以了解是否伴有糖尿病
- C. 老年性阴道炎的治疗原则是增加阴道抵抗力及抑制细菌生长
- D. 阴道炎病人除应用药物控制炎症外，宣传个人卫生和公共卫生，防止交叉感染
- E. 阴道炎的治疗必须在局部用药外加全身抗感染治疗
8. 酶的必需基团是
- A. 酶的辅助部分
- B. 与酶催化作用有关的基团
- C. 一些金属离子
- D. 酶蛋白的肽腱
- E. 酶蛋白的表面电荷
9. 治疗哮喘持续状态宜选用
- A. 异丙肾上腺素
- B. 氨茶碱
- C. 麻黄碱
- D. 糖皮质激素
- E. 色甘酸二钠
10. 下列关于肺泡表面活性物质生理作用的叙述，哪一项是错误的
- A. 稳定肺泡内压
- B. 降低肺泡表面张力
- C. 增加肺的回缩力
- D. 维持肺泡于适当的扩张状态
- E. 阻止血管内水分滤入肺泡
11. 能提示胎儿肺是否成熟的指标是
- A. 肌酐值
- B. 淀粉酶值
- C. 卵磷脂/磷脂酰甘油
- D. 胆红素类物质值
- E. 脂肪细胞出现率
12. 在病例对照研究中，病例来自
- A. 病例的邻居中未患该病的人
- B. 同一或多个医疗机构中诊断的其他疾病病例
- C. 社区人口中未患该病的人
- D. 医院的现患病例
- E. 病例的配偶
13. 香豆素类抗凝血作用显效慢的原因是
- A. 吸收慢
- B. 生物利用度低
- C. 药物与血浆蛋白结合的百分比高
- D. 对体内原有的活化凝血因子无影响
- E. 半衰期长
14. 对医德审慎理解有误的是
- A. 用药如用兵
- B. 用药如用刑
- C. 戒惧恐惧

-
- D. 避开有风险的病人
E. 胆欲大而心欲小
15. 为何小儿不宜使用喹诺酮类药物
A. 影响生长发育
B. 引起中枢神经系统不良反应
C. 肾毒性
D. 耳毒性
E. 引起软骨组织损害
16. 对 1, 25-(OH)3-D 的叙述错误的是
A. 维生素 D, 在肝、肾经羟化酶催化转变而成
B. 促进小肠对钙、磷的吸收
C. 加速破骨细胞的溶骨作用
D. 促进成骨细胞的成骨作用
E. 抑制肾小管对钙、磷的吸收
17. 下列各组疾病中均为乙类传染病的是
A. 肺结核, 新生儿破伤风
B. 黑热病, 手足口病
C. 流行性出血热, 黑热病
D. 鼠疫, 狂犬病
E. 麻风病, 伤寒
18. 肝性脑病患者的饮食治疗不恰当的是
A. 高热卡
B. 高碳水化合物
C. 高蛋白质
D. 高维生素
E. 不能进食可鼻饲或静滴葡萄糖
19. 不表达 HLA-I 类分子的细胞是
A. 成熟的红细胞
B. B 淋巴细胞
C. 皮肤细胞
D. 单核细胞
E. 树突状细胞
20. 慢性胃溃疡肉眼形态通常是
A. 直径 2cm 以上火山口状或不规则溃疡
B. 直径 2cm 以内圆形溃疡, 贲门侧边缘呈阶梯状
C. 直径 2cm 以内圆形溃疡, 幽门侧边缘呈阶梯状
D. 直径 2cm 以内圆形溃疡, 幽门侧边缘呈潜掘状
E. 直径 2cm 以内圆形溃疡, 周围黏膜皱襞排列紊乱
21. 观察期（以月为单位）内的新病例人数/同期暴露人口数×100%为
A. 发病率
B. 罹患率
C. 患病率
D. 感染率
E. 病死率



22. 坏疽与一般坏死的区别在于坏疽

- A. 坏死范围大，并有腐败菌感染
- B. 细胞核消失
- C. 可发生炎症反应
- D. 不可恢复
- E. 有自溶

23. 不属于初级结合胆汁酸的是

- A. 牛磺胆酸
- B. 甘氨胆酸
- C. 甘氨脱氧胆酸
- D. 牛黄鹅脱氧胆酸
- E. 甘氨鹅脱氧胆酸

24. 有机磷酸酯农药抑制的酶是

- A. 胆碱酯酶
- B. 己糖激酶
- C. 琥珀酸脱氢酶
- D. 柠檬酸合成酶
- E. 异柠檬酸脱氢酶

25. 人工流产综合反应的主要发生原因是

- A. 疼痛刺激
- B. 迷走神经兴奋
- C. 精神过度紧张
- D. 吸宫后负压过大
- E. 较长时间仰卧截石位

26. 干扰素抗病毒的作用机制

- A. 阻碍病毒吸附于敏感细胞
- B. 与病毒结合，阻止其穿入和脱壳
- C. 直接抑制病毒的生物合成
- D. 诱导细胞产生抗病毒蛋白
- E. 干扰病毒的释放

27. 下列属于公共卫生道德的原则的是

- A. 社会强制原则
- B. 自然平衡原则
- C. 有利于患者原则
- D. 多部门合作和协作原则
- E. 个人自由原则

28. 磷酸戊糖途径的主要生理意义在于

- A. 提供能量
- B. 生成磷酸丙糖
- C. 糖代谢联系的枢纽
- D. 将 NADP 还原成 NADPH
- E. 为氨基酸合成提供原料

29. 在肾脏病理情况下，出现蛋白尿的原因是

- A. 肾小球滤过率增大



-
- B. 肾小球毛细血管血压增大
C. 肾小管对蛋白质重吸收减少
D. 滤过膜上的糖蛋白减少
E. 血浆蛋白尿的含量增多
30. 描述一组偏态分布计量资料的变异度，宜选择
A. 全距(R)
B. 中位数(M)
C. 标准差(S)
D. 变异系数(CV)
E. 四分位数间距
31. 下述哪种药物可能诱发或加重支气管哮喘
A. 肾上腺素
B. 普萘洛尔
C. 酚苄明
D. 酚妥拉明
E. 甲氧胺
32. 在中脑上、下丘之间切断动物脑干，可出现
A. 肢体痉挛麻痹
B. 脊髓休克
C. 去皮层僵直
D. 去大脑僵直
E. 屈肌紧张性亢进
33. 人脑对已有表象进行加工改造形成新形象的过程成为
A. 创造
B. 概括
C. 想象
D. 思维
E. 抽象
34. 属于医务人员之间关系模式的是
A. 指导-被指导型
B. 平等-合作型
C. 契约型
D. 共同参与型
E. 主动-被动型
35. 药品成分含量与国家药品标准不符合的是
A. 新药
B. 假药
C. 劣药
D. 常规药品
E. 以上都不是
36. 糖皮质激素诱发和加重感染的主要原因
A. 患者对激素不敏感
B. 激素用量不足
C. 激素能直接促进病原微生物繁殖

-
- D. 激素抑制免疫反应，降低机体抵抗力
E. 使用激素时未能应用有效抗菌药物
37. 关于医德评价的说法，错误的是
- A. 医德评价有相对应明确和共识的标准
B. 进行医德评价不能只看行为的客观效果
C. 医德评价的方式有社会舆论、内心信念和传统习俗
D. 医德评价是医德原则和规范转化为医务人员行为的中介和桥梁
E. 医德评价的主体包括他人和社会
38. 不协调性子宫收缩乏力的恰当处理应是
- A. 人工破膜
B. 肌注哌替啶
C. 温肥皂水灌肠
D. 静滴缩宫素
E. 针刺合谷、三阴交穴位
39. 炎性肉芽肿内的细胞成分不包括
- A. 上皮细胞
B. 淋巴细胞
C. 巨噬细胞
D. 多核巨细胞
E. 成纤维细胞
40. 通常生物氧化是指生物体内是
- A. 加氧反应
B. 脱氢反应
C. 释出电子反应
D. 与氧分子结合的反应
E. 营养物氧化成水和二氧化碳的过程
41. 不属于氨基糖苷类抗生素共同特点
- A. 抗菌谱较广
B. 不良反应多，如肾、耳等毒性
C. 药物间存在交叉耐药性
D. 能被细菌产生的钝化酶所灭活
E. 药物极性小
42. 下列关于 DNA 双螺旋结构叙述正确的是
- A. A 与 U 配对
B. 形成 β 折叠
C. 有多聚 A 的尾巴
D. 主要形成左手螺旋
E. 两条链成反向平行
43. 糖尿病病人出现尿糖的原因是
- A. 部分远曲小管对糖吸收达到极限
B. 部分近球近球小管对糖吸收达到极限
C. 超滤液中出现葡萄糖
D. 部分远曲小管重吸收障碍
E. 部分近球小管对糖吸收障碍

-
44. 具有抗麻风病及广谱抗菌作用的一线抗结核药物是
- A. 异烟肼
 - B. 利福平
 - C. 乙胺丁醇
 - D. 链霉素
 - E. 吡嗪酰胺
45. 有权指定医疗机构为自愿接受艾滋病咨询、检测的人员免费提供咨询和初筛选的部门是
- A. 县级卫生、人口与计划生育部门
 - B. 县级以上地方人民政府卫生行政部门
 - C. 国务院卫生行政部门
 - D. 省级疾病预防控制机构
 - E. 所在地疾病预防控制机构
46. 临床诊疗的医学道德原则中的最优化原则内容不包括
- A. 病痛最小
 - B. 耗费最少
 - C. 安全度最高
 - D. 寿命最长
 - E. 疗效最好
47. 小儿出现生理性贫血的时期是
- A. 生后 5~7 天
 - B. 生后 1 个月左右
 - C. 生后 2~3 个月
 - D. 生后 5~7 个月
 - E. 生后 1 年
48. 平静呼吸时，参与呼吸动作的主要肌肉是
- A. 斜角肌和胸锁乳突肌
 - B. 膈肌和肋间内肌
 - C. 肋间内肌和腹壁肌肉
 - D. 肋间内肌和肋间外肌
 - E. 膈肌和肋间外肌
49. 下列有关酶的叙述，正确的是
- A. 生物体内的无机催化剂
 - B. 对底物都有绝对专一性
 - C. 能显著降低反应活化能
 - D. 催化活性都需要特异的辅酶
 - E. 在体内发挥催化作用时，不受任何调控
50. 强心苷治疗心房颤动的机制是
- A. 缩短心房的有效不应期
 - B. 降低浦肯野纤维
 - C. 抑制心房的异位起搏点
 - D. 减慢房室传导
 - E. 抑制窦房结
51. 子宫内膜癌Ⅱ期患者，首选的治疗措施应是
- A. 放射治疗

-
- B. 放疗后行全子宫及双附件切除术
C. 行扩大子宫全切及双附件切除术
D. 子宫广泛切除及盆腔淋巴结清扫术
E. 大剂量孕激素类药物治疗
52. 大脑中动脉分支血栓形成可导致脑组织发生
A. 凝固性坏死
B. 液化性坏死
C. 干酪样坏死
D. 脂肪坏死
E. 湿性坏疽
53. 糖皮质激素对下列血细胞数量的影响的叙述，哪项错误
A. 使红细胞增多
B. 使血小板增多
C. 使中性粒细胞增多
D. 使淋巴细胞增多
E. 使嗜酸性粒细胞减少
54. 酶促反应中决定酶专一性的部分是
A. 底物
B. 辅基或辅酶
C. 金属离子
D. 酶蛋白
E. 催化基团
55. 常与麻醉药合用以减少出血、延长麻醉时间的是
A. 多巴胺
B. 麻黄碱
C. 阿托品
D. 去甲肾上腺素
E. 肾上腺素
56. 体力劳动时，心搏出量和作功持久明显地增高，其主要调节机制是
A. 全身体液调节
B. 局部体液调节
C. 正反馈调节
D. 等长调节
E. 异长调节
57. 女，27岁，妊娠分娩胎儿死亡，3天后出现精神异常，并出现黄疸，尿检中有蛋白，下列检查对诊断帮助最大的是
A. 脑电图
B. 肾功能
C. 血胆红素
D. 血常规
E. 血清抗核抗体
58. 白细胞分化抗原是指
A. 白细胞分化过程中出现的各种膜分子
B. T细胞分化过程中出现的各种膜分子

-
- C. B 细胞分化过程中出现的各种膜分子
D. 淋巴细胞分化过程中出现的各种膜分子
E. 血细胞在分化成熟为不同谱系、分化的不同阶段及活化过程中出现或消失的细胞表面标记分子
59. 1mol 下列物质在有氧时彻底氧化，净生成 ATP 数最多的是
A. 葡萄糖
B. 丙酮酸
C. 乳酸
D. 1, 3-二磷酸甘油酸
E. 1, 6-二磷酸果糖
60. 念珠菌阴道炎的治疗，错误的是
A. 积极治疗糖尿病
B. 用 4% 碳酸氢钠液冲洗阴道
C. 克霉唑栓剂放置阴道
D. 甲硝唑栓剂放置阴道
E. 1% 甲紫液涂擦阴道
61. 从一个计量资料的总体中抽样，产生抽样误差的原因是
A. 样本均数不等于零
B. 总体中的个体存在差别
C. 样本均数大于总体均数
D. 样本是从总体中有意识抽取的一部分
E. 总体均数不等于零
62. 子宫内膜癌最多见的病理类型是
A. 腺癌
B. 鳞癌
C. 鳞腺癌
D. 腺角化癌
E. 透明细胞癌
63. 临终关怀的目的是
A. 提高患者生存质量
B. 减轻家属经济负担
C. 防止患者自杀
D. 减轻患者痛苦
E. 节约社会卫生资源
64. 下列哪个部位形成的假膜性炎对人的危险性最大
A. 咽喉
B. 气管
C. 结肠
D. 胸腔
E. 心包腔
65. 关于肝脂肪变性的叙述，下列哪项是正确的
A. 肝淤血时肝脂肪变性仅局限在肝小叶中央区
B. 肝淤血时肝脂肪变性主要在肝小叶周边区
C. 磷中毒时肝脂肪变性主要在肝小叶中央区

D. 磷中毒时肝脂肪变性先发生在肝小叶中央区，延伸至肝小叶周边区

E. 肝淤血时肝脂肪变性先发生在肝小叶中央区，延伸至肝小叶周边区

66. 梗死灶呈不规则，地图状分布的为

A. 肺梗死

B. 肾梗死

C. 肠梗死

D. 心肌梗死

E. 脑梗死

67. 总体率 95% 可信区间的意义是

A. 95% 的正常值在此范围

B. 95% 的样本率在此范围

C. 95% 的总体率在此范围

D. 总体率在此范围内的可能性为 95%

E. 样本率在此范围内的可能性为 95%

68. 治疗变异型心绞痛首选

A. 普萘洛尔

B. 硝酸甘油

C. 硝苯地平

D. 维拉帕米

E. 阿司匹林

69. 均数为 0，标准差为 1 的分布是

A. 正态分布

B. 标准正态分布

C. 正偏态分布

D. 负偏态分布

E. 以上都不是

70. 槟榔肝是指

A. 肝脂肪变性伴淤胆

B. 慢性肝淤血水肿

C. 门脉性肝硬化

D. 慢性肝淤血脂肪变性

E. 坏死后性肝硬化

【A2 型题】答题说明：每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

71. 某年轻女患者，自诉左侧乳房有硬结，到某医院外科诊治。经活体组织检查证实为乳腺癌。经患者及其家属同意后，收住院行乳腺癌根治术。在术中右侧乳房也作了活体组织切片，检查结果为“乳腺腺体增生”。虽然目前不是癌组织，但是将来有癌变的可能性，医生决定将右侧乳房切除。术后患者及其家属认为，医生未经患者或其家属同意切除右侧乳房，要求追究医生的责任并要求赔偿。上述病例从伦理学上分析，哪一个说法是正确的

A. 该医生未经患者及其家属同意，自行切除患者右侧乳房，损害了患者的知情同意权

B. 该医生为了防止右侧乳房癌变，切除右侧乳房的做法是正确的

C. 该医生未经患者及其家属同意，自行切除患者右侧乳房，是对患者的伤害，不符合无伤原则

D. 患者及其家属的赔偿要求是无理的

E. 以上说法都不对

72. 某起医疗事故中的患者，向法院提起民事赔偿诉讼。依据《医疗事故处理条例》赔偿费用办法的规定，不应由医方赔偿的

A. 住院费

B. 检查费

C. 治疗费

D. 护理费

E. 营养费

73. 应用一种筛选乳腺癌的试验，选择经活检证实患有乳腺癌的 1000 名妇女和未患乳腺癌的 1000 名妇女进行筛选试验检查。结果为患乳腺癌组中有 900 名为阳性，该试验的灵敏度是

A. 50%

B. 25%

C. 10%

D. 90%

E. 75%

74. 执业医师贺某 2014 年 4 月因触犯刑律，被判处有期徒刑 2 年，2015 年 12 月，贺某拟继续从事临床医疗工作。依据《执业医师法》规定，主管部门应给贺某办理

A. 不予注册，并说明理由

B. 注销注册，并说明理由

C. 变更注册，并说明理由

D. 重新注册，并说明理由

E. 再次注册，并说明理由

75. 夏季某日某建筑工地食堂，工人进食过夜的米糕食物中毒，致病的是

A. 沙门菌食物中毒

B. 副溶血性弧菌食物中毒

C. 变形杆菌食物中毒

D. 真菌性食物中毒

E. 葡萄糖菌肠毒素中毒

76. 25 岁，已婚妇女。停经 80 天，阴道少量流血 3 天，大量流血半天。入院查：面色苍白，血压 80/50mmHg，脉搏 120 次/分，阴道内有大量血块，宫口有组织物堵塞，子宫约 50 天孕大，两侧附件阴性，应诊断

A. 完全流产

B. 不全流产

C. 稽留流产

D. 难免流产

E. 先兆流产

77. 在皮肤科门诊，一男性患者被确诊淋病后，请求医生不要告诉在诊室外等候他的妻子，以免妻子和他离婚。此时，在不伤害该对夫妇的情况下，皮肤科医生最合适的做法是

A. 患者的妻子不问就不讲

B. 患者的妻子要问就照实说

C. 患者的妻子要问就说谎

D. 患者的妻子要问就拒绝回答

E. 建议患者主动告诉妻子自己患了性病

78. 以积极有效的心理活动，平稳正常的心理状态，对当前和发展着的自然与社会环境保持良好的适应，称为

- A. 心理健康
- B. 行为正常
- C. 精神正常
- D. 人格健全
- E. 适应良好

79. 患者，女，32岁，曾生育过有严重缺陷的患儿。再次妊娠前，夫妻双方拟接受医学检查。

依据《母婴保健法》规定，有权进行医学检查的机构是

- A. 县级医疗保健机构
- B. 县级人口计生服务机构
- C. 县级疾病控制机构
- D. 县级以上医疗保健机构
- E. 县级以上疾病控制机构

80. 女，40岁，近3个月来食欲增加，出汗增加，怕热，体重下降并易激惹，活动增加，独处时偶尔听到有人议论他，或觉得一些行人对他吐痰等，实验室检查：血T₃、T₄增加，空腹血糖5.5mmol/L。该患者最可能的诊断是

- A. 糖尿病所致精神障碍
- B. 精神分裂症
- C. 躁狂发展
- D. 神经性贪食症
- E. 甲状腺功能亢进症所致精神障碍

81. 女婴，6个月。咳嗽伴喘憋2天，查体：T38℃，P120次/分，R80/分，烦躁不安，双肺明显哮鸣音，喘息缓解时可闻及少许中、小湿啰音，肝肋下2.0cm。最可能的诊断是

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 呼吸道合胞病毒肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

82. 女，25岁，葡萄胎清宫术后12个月，阴道流血1周，妇科检查：阴道口处见一直径2cm紫蓝色结节，子宫稍大，质软，双侧附件正常。胸部X线片未见异常。尿妊娠试验（+）。阴道病灶组织病理检查见成对高度增生滋养细胞，无绒毛结构，最有可能的诊断

- A. 绒毛膜癌
- B. 子宫内膜异位症
- C. 葡萄胎
- D. 侵蚀性葡萄胎
- E. 阴道癌

83. 女，27岁，已婚。停经9周，阵发性下腹痛3天，阴道少量流血2天。为判断是否能继续妊娠，首选的辅助检查是

- A. 尿妊娠试验
- B. B超检查
- C. 胎心监测
- D. 胎盘功能检查
- E. 监测血孕酮

84. 女, 48岁, 放置宫内节育器(IUD)10年, 不规则阴道流血3个月, 妇科检查: 宫颈光滑。宫颈细胞学检查无异常。首选处理方法

- A. 止血药治疗
- B. 抗感染治疗
- C. 取出IUD+诊断性刮宫术
- D. 取出IUD+抗感染治疗
- E. 人工周期治疗

85. 男, 40岁。因急性粒细胞白血病入院。查体: 四肢皮肤多处出血点和瘀斑。化验 Plt $8 \times 10^9/\text{L}$ 。给予单采血小板输注。输注4h后, 患者出现胸闷、呼吸困难。急查胸部X线片可见弥漫性阴影, 患者出现胸闷、呼吸困难。急查胸部X线片可见弥漫性阴影。患者最可能发生的输血不良反应是

- A. 急性过敏反应
- B. 急性溶血反应
- C. 细菌性感染
- D. 循环超负荷
- E. 输血相关急性肺损伤

86. 男, 25岁。因重型再生障碍性贫血入院, 准备10天后接受异基因造血干细胞移植。因大量鼻出血和牙龈出血拟于输血, 需要预订的血液成分是

- A. 单采血小板
- B. 辐照单采血小板
- C. 辐照冷沉淀
- D. 辐照新鲜冷冻血浆
- E. 新鲜冷冻血浆

86. 【答案】C

【解析】单采血小板为同一个人血小板, 辐射后可以灭活其中的淋巴细胞。

87. 男, 55岁。大量饮酒10余年, 停止喝酒后2天出现走路不稳、四肢震颤, 看到床上有鱼、虾在跳, 分不清方向, 判断不了时间。头颅CT无异常。该患者最可能的诊断是

- A. 癫痫所致精神障碍
- B. 脑器质性精神障碍
- C. 酒精性痴呆
- D. 震颤谵妄
- E. 精神分裂症

88. 女, 25岁。产后30天, 下腹痛伴发热4天。查体: $T 39^\circ\text{C}$, $\text{P} 98/\text{分}$, $\text{R} 26/\text{分}$ 。脓血性恶露, 有恶臭。血常规: $\text{WBC} 13 \times 10^9/\text{L}$, $\text{NO.} 88$, 最可能的判断结果是

- A. 晚期产后出血
- B. 产褥中暑
- C. 急性膀胱炎
- D. 正常产褥
- E. 产褥感染

89. 女婴, 1天。足月产, 出生1分钟Apgar评分3分。查体: $\text{P} 90/\text{分}$, $\text{R} 30/\text{分}$,嗜睡, 面色微绀, 前囟饱满, 心音低钝, 四肢肌张力减低, 拥抱反射消失。最可能的诊断是

- A. 胎粪吸入综合征
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿低血糖

D. 新生儿缺氧缺血性脑病

E. 新生儿肺透明膜病

90. 男孩，5岁。因生长和智力发育落后就诊。查体：身材矮小，头围小，限距宽，鼻梁低，外耳小，通贯手，心脏听诊有杂音。为明确诊断最合适的检查是

A. 智力测定

B. 血清T₃、T₄检测

C. 头颅CT

D. 超声心动图检查

E. 染色体核型分析

91. 女婴，10个月。腹泻5天，约8次/日，呈稀水样，伴呕吐，每天2~3次，尿量减少。

查体：皮肤干，弹性差，眼窝、前囟凹陷，心音低钝。最重要的处理措施是

A. 控制感染

B. 给予助消化药

C. 给予肠道微生态制剂

D. 纠正水电解质紊乱

E. 给予止吐药

92. 男孩，2岁。活动后气急、口唇青紫1年余。查体：胸骨左缘第3肋间闻及3/6级喷射性收缩期杂音。胸部X线片示心影稍增大，心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷，肺门血管影缩小，肺透亮度增加。最可能的诊断是

A. 完全性大动脉转位

B. 房间隔缺损合并肺动脉瓣狭窄

C. 空间隔缺损合并肺动脉高压

D. 动脉导管未闭

E. 法洛四联症

93. 男，35岁。突发剧烈头痛伴恶心、呕吐、烦躁不安1天。查体：双眼视力减退、双颞侧偏盲。急诊CT示鞍区椭圆形占位性病变，3cm×2cm×2cm大小，高密度影，可见液平面；幕上脑室扩大。应采取的有效治疗措施是

A. 立即给予糖皮质激素治疗

B. 立即给予神经营养药

C. 保守治疗，病情稳定后手术治疗

D. 迅速给予镇静处理

E. 急症手术视神经减压

94. 初孕妇，22岁。妊娠32周，自觉头痛、视物模糊2周，晨起突然出现持续性腹痛且逐渐加重。腹部检查：子宫板状硬。该患者最可能的诊断是

A. 先兆早产

B. 胎盘早剥

C. 急性阑尾炎

D. 前置胎盘

E. 先兆子宫破裂

95. 女，60岁。突然左侧肢体运动障碍3小时。头颅CT示右侧基底节区低密度灶。最可能的诊断是

A. 脑出血

B. 短暂性脑缺血发作

C. 颅内肿瘤

D. 脑血栓形成

E. 脑栓塞

96. 初孕妇，25岁。现妊娠9周。半年前曾因感冒诱发心力衰竭。查体：心率110次/分，心尖部闻及舒张期杂音，肝肋下可触及。该患者正确的处理措施是

A. 继续妊娠，不需特殊治疗

B. 继续妊娠，增加产前检查次数

C. 终止妊娠，行钳刮术

D. 继续妊娠，需口服地高辛

E. 终止妊娠，行负压吸引术

97. 一男婴，营养状况良好，头围46cm，前囟0.5cm，身长75cm。最可能的月龄是

A. 4个月

B. 8个月

C. 10个月

D. 6个月

E. 12个月

98. 女孩，3岁。咳嗽7天，发热3天。查体：咽红，双肺可闻及较固定的中、细湿啰音。

最可能的诊断是

A. 上呼吸道感染

B. 支气管肺炎

C. 支气管哮喘

D. 支气管炎

E. 毛细支气管炎

99. 女孩，6岁，反复咳嗽3个月，活动后加重，常于夜间咳醒，痰不多，无发热。抗生素治疗无效。既往有湿疹史。查体：双肺呼吸音粗，余无异常，最可能的诊断是

A. 支气管炎

B. 支气管异物

C. 咳嗽变异性哮喘

D. 支气管肺炎

E. 喘息性支气管炎

100. 女65岁，头部外伤后昏迷2小时。查体：中度昏迷，右侧瞳孔散大。对光反射消失，左侧肢体肌张力增高，病理征(+)。头颅CT示右额颞部高密度新月形影。最可能的诊断是

A. 急性硬脑膜下血肿

B. 急性硬脑膜外血肿

C. 急性硬脑膜下积液

D. 脑挫伤

E. 脑内血肿

【A3/A4型题】答题说明：以下提供若干个病例，每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(101~105题共用题干)

女婴，9个月。腹泻4天，加重2天。暗红色水样便每日10次，量多，腥臭，伴高热、呕吐、少尿。查体：精神萎靡，呈嗜睡状，前囟眼窝凹陷，皮肤弹性差，心音较低钝，腹胀，肝脾不大。实验室检查：粪镜检有大量脓血细胞，血钠135mmol/L，血钾3.5mmol/L。101.

患儿最可能的诊断是

- A. 轮状病毒肠炎
- B. 大肠埃希菌肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌肠炎
- D. 细菌性痢疾
- E. 真菌性肠炎

102. 该患儿腹泻脱水的程度与性质应是

- A. 重度等渗性
- B. 中度等渗性
- C. 中度低渗性
- D. 中度高渗性
- E. 重度低渗性

103. 施行液体疗法，第一天补液的总量应是每公斤体重

- A. 160~180ml
- B. 70~110ml
- C. 120~150ml
- D. 30~60ml
- E. 190~220ml

104. 第一天补液所采用液体的成分应是

- A. 2/3 张含钠液
- B. 1/2 张含钠液
- C. 1/3 张含钠液
- D. 1/5 张含钠液
- E. 等张含钠液

105. 对该患儿最不适合的处理是

- A. 使用止泻剂
- B. 选用有效的抗生素
- C. 使用微生态制剂
- D. 继续饮食
- E. 使用肠黏膜保护剂

(106~107 题共用题干)

女，24岁。停经5周诊断为早孕，行人工流产术，吸宫后探宫腔发现探不到宫底，出血不多，自述心悸轻度腹痛及恶心。

106. 该患者最可能的诊断是

- A. 子宫畸形
- B. 子宫穿孔
- C. 人工流产综合反应
- D. 羊水栓塞
- E. 葡萄胎

107. 此时该患者首选的处理方法是

- A. 吸氧，给予升压药
- B. 继续手术，清空子宫
- C. 暂停手术，密切观察病情

-
- D. 静脉注射阿托品
 - E. 立即行剖腹探查术

(108~110 题共用题干)

男，15岁。骑摩托车时不慎摔倒，左颞顶着力，短暂昏迷后清醒。伤后30分钟送医院，急诊头颅CT示左颞顶颅骨骨折。2小时后头痛加剧，逐渐昏迷，左侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪。

108. 为明确诊断，应首选的检查是


- A. 颅骨以及颈部正侧位X线片
- B. 颈部CT
- C. 头颅MRI
- D. 脑电图
- E. 头颅CT

109. 首先考虑的诊断是

- A. 劲椎损伤、颈髓受压
- B. 脑挫裂伤、脑干损伤
- C. 急性硬脑膜外血肿、小脑幕切迹疝
- D. 急性硬脑膜下血肿、脑挫裂伤
- E. 急性硬脑膜下血肿、枕骨大孔疝

110. 应采取的有效治疗措施是

- A. 立即收入病房，观察生命征变化
- B. 应用抗生素
- C. 急诊行血肿清除减压术
- D. 立即应用降颅压药物
- E. 急诊行颈椎牵引术



金英杰医学
JINYINGJIE.COM[®]

(111~112 题共用题干)

女，60岁，G4P4。近两年来阴道脱出一肿物，逐渐增大。妇科检查：宫颈光滑，屏气用力后宫颈和部分宫体脱出阴道口外，子宫萎缩，双侧附件正常。

111. 对该患者子宫脱垂程度判断正确的是

- A. I度轻型
- B. III度
- C. II度轻型
- D. I度重型
- E. II度重型

112. 该患者适宜的治疗方法是

- A. 放置子宫托
- B. 经阴道子宫切除术
- C. 阴道纵膈形成术
- D. Manchester手术
- E. 盆底肌肉锻炼

(113~115 题共用题干)

女，25岁，停经3个月，早孕反应消失，阴道少许流血2天。妇科检查：宫口闭，子

宫如妊娠 8 周大，质软，双侧附件区未触及异常。

113. 为明确诊断，首选的检查是

- A. 腹部 CT 检查
- B. 多普勒超声检查
- C. B 超检查
- D. 诊断性刮宫
- E. 血孕酮测定

114. 该患者最可能的诊断是

- A. 完全流产
- B. 难免流产
- C. 流产感染
- D. 留滞流产
- E. 先兆流产

115. 该患者正确的处理措施是

- A. 继续观察 1 周
- B. 孕激素保胎治疗
- C. 静脉滴注缩宫素引产
- D. 雌激素治疗后刮宫
- E. 孕激素治疗后刮宫

(116~118 题共用题干)

男婴，3 天。黄疸速度加重 2 天，足月儿，母乳喂养。母亲血型为 O 型、Rh 阳性，父亲血型为 AB 型、Rh 阳性，实验室检查：TBil 200 μmol/L。

116. 为确认最有效的检查是

- A. 血培养
- B. 肝功能
- C. 改良直接抗人球蛋白实验
- D. 血型
- E. 血涂片查红细胞形态

117. 最可能的诊断是

- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿肝炎综合征
- C. 新生儿母乳性黄疸
- D. Rh 血型不和溶血病
- E. ABO 血型不和溶血病

118. 首选应采取的治疗措施是

- A. 使用抗生素
- B. 光疗
- C. 口服苯巴比妥
- D. 输注白蛋白
- E. 换血疗法

(119~121 题共用题干)

男，30 岁。近 1 个月来多次因阵发性恐惧、胸闷、濒死感在医院急诊科就诊，症状持续约

半小时后消失。多次查血常规心电图及头颅 CT 等未见明显异常。患者为此担心苦恼，但仍能坚持工作。

119. 该患者的主要症状是

- A. 心前区疼痛
- B. 急性焦虑发作
- C. 慢性焦虑
- D. 高血压危象
- E. 转换症状

120. 最可能的诊断是

- A. 二尖瓣脱垂
- B. 甲状腺功能亢进症
- C. 广泛性焦虑障碍
- D. 疑病障碍
- E. 惊恐障碍

121. 长期治疗最适当的药物是

- A. 地西泮
- B. 甲巯咪唑
- C. 硝酸甘油
- D. 帕罗西汀
- E. 普萘洛尔

(122~124 题共用题干)

女，25岁。已婚。平时月经规律。停经45天，右下腹剧痛5小时伴头晕及肛门坠胀感。查体：BP80/56mmHg，面色苍白，痛苦病容，下腹部压痛及反跳痛（+），尤以右侧为著，肌紧张不明显，移动性浊音（+）。妇科检查：宫颈举痛，宫体稍大，右附件区触及不规则包块，大小约4cm×3cm×3cm，压痛（+）。实验室检查：Hb100g/L。

122. 该患者最可能的诊断是

- A. 卵巢脓肿蒂扭转
- B. 卵巢子宫内膜异位囊肿破裂
- C. 卵巢滤泡囊肿破裂
- D. 卵巢黄体囊肿破裂
- E. 输卵管妊娠破裂

123. 该患者简单可靠的辅助检查是

- A. 腹部 CT 检查
- B. 阴道后穹窿穿刺
- C. 腹部 X 线检查
- D. 宫腔镜检查
- E. 腹腔镜检查

124. 该患者正确的处理措施是

- A. 口服止血药物
- B. 肌肉注射甲氨蝶呤
- C. 手术治疗
- D. 中药活血化瘀
- E. 对症处理，严密观察

(125~127 题共用题干)

女，60岁。外阴、阴道灼热感7天。妇科检查：阴道粘膜有散在出血点，阴道内少许分泌物，呈淡黄色。

125. 该患者首先考虑的诊断为

- A. 萎缩性阴道炎
- B. 淋菌性阴道炎
- C. 细菌性阴道病
- D. 外阴阴道念珠菌病
- E. 滴虫阴道炎

126. 其最可能的病因是

- A. 雌激素水平低下
- B. 淋菌感染
- C. 阴道菌群失调
- D. 念珠菌感染
- E. 滴虫感染

127. 该患者首选的外用药物是

- A. 制霉菌素
- B. 红霉素
- C. 孕激素
- D. 雌激素
- E. 甲硝唑

(128~130 题共用题干)

男孩，7岁。剧烈运动后胸闷，气短1个月。查体：心前区未触及震颤，胸骨左缘2~3肋间闻及3/6级收缩期喷射性杂音，P2增强，固定分裂。

128. 最可能的诊断是

- A. 动脉导管未闭
- B. 单纯肺动脉瓣狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 中型室间隔缺损
- E. 小型室间隔缺损

129. 心脏杂音形成的最直接原因是

- A. 肺动脉瓣明显狭窄
- B. 右心压力负荷增加
- C. 经肺动脉瓣血流量增多
- D. 主动脉瓣相对狭窄
- E. 血液经房间隔缺损自左房流入右房

130. 最典型的心电图改变是

- A. 左室高电压
- B. 不完全性右束传导阻滞和电轴右偏
- C. 左心房肥大
- D. 二度房室传导阻滞I型
- E. 一度房室传导阻滞

【B型题】答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(131~132题共用备选答案)

- A. 35cm
- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 50cm
- E. 56cm

131. 5岁儿童的头围约是

132. 3个月龄婴儿的头围约是

(133~135题共用备选答案)

- A. 心力衰竭
- B. 中毒性脑病
- C. 中毒性肠麻痹
- D. DIC
- E. 酸中毒

133. 肺炎患儿出现惊厥、昏迷、呼吸不规则

134. 肺炎患儿呼吸困难忽然加重，心率增快，肝脏迅速增大

135. 肺炎患儿出现严重腹胀，肠鸣音消失，甚至吐咖啡渣样物

(136~137题共用备选答案)

- A. 知情同意
- B. 支持医学发展
- C. 患者利益至上
- D. 医德境界
- E. 内心信念

136. 属于患者权利的是

137. 属于医德自我评价方式的是

(138~140题共用备选答案)

- A. M受体阻断药
- B. H泵抑制药
- C. H受体阻断药
- D. 胃泌素受体阻断药
- E. H受体阻断药

138. 阿托品是

139. 雷尼替丁是

140. 洛赛克是

(141~144题共用备选答案)

- A. 乙酰乙酸硫激酶

-
- B. HMGCoA 还原酶
 - C. 乙酰 CoA 羧化酶
 - D. HMGCoA 裂解酶
 - E. HMGGoA 合成酶
141. 合成胆固醇的关键酶是（ ）
142. 合成酮体的关键酶是
143. 催化酮体氧化的酶是
144. 合成脂酸的关键酶是

(145~147 题共用备选答案)

- A. 几何均数
 - B. 四分位间距
 - C. 中位数
 - D. 算数均数
 - E. 标准差
145. 反映一组观察值，离散程度最好的指标是
146. 若偏态分布资料一端或两端无确切数值，描述其集中趋势的指标是
147. 用于反映一组抗体滴度的指标是

(148~150 题共用备选答案)

- A. 中心静脉压低，血压正常
 - B. 中心静脉压低，血压低
 - C. 中心静脉压高，血压低
 - D. 中心静脉压高，血压正常
 - E. 中心静脉压正常，血压低
148. 严重血容量不足
149. 容量血管过度收缩
150. 心源性休克

